

Список беспозвоночных
ФГБУ «Национального парка «Паанаярви»

	Русское название вида	Латинское название вида
	БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ - 3307 вида	
	Раковинные амебы - 65 видов	
1		Alabasta militaris (Penard, 1890)
2		Arcella crenulata
3		Arcella vulgaris (Ehrenberg, 1830)
4		Archerella flavum
5		Argynnia crenulata
6		Assulina muscorum (Greeff, 1888)
7		Assulina seminulum
8		Centropyxis aerophila (Deflandre, 1929)
9		Centropyxis orbicularis (Deflandre, 1929)
10		Centropyxis sylvatica (Deflandre, 1929)
11		Corythion delamarei (Bonnet & Thomas, 1960)
12		Corythion dubium (Taraneck, 1871)
13		Cryptodifflugia oviformis
14		Cryptodifflugia pusilla
15		Cryptodifflugia sacculus (Penard, 1902)
16		Cyclopyxis arcelloides
17		Cyclopyxis eurytoma (Deflandre, 1929)
18		Cyclopyxis eurytoma v. parvula (Bonnet et Thomas 1960)
19		Cyclopyxis ambigua (Bonnet et Thomas, 1960)
20		Difflugia bryophila
21		Difflugia lucida
22		Difflugia minuta
23		Difflugia penardi
24		Difflugia pristis
25		Difflugia pulex
26		Euglypha ciliata
27		Euglypha cuspidata (Bonnet, 1959)
28		Euglypha leavis
29		Euglypha rotunda
30		Euglypha strigosa (Ehrenberg, 1848)
31		Euglypha strigosa glabra
32		Euglypha tuberculata
33		Galeripora arenaria
34		Galeripora catinus
35		Galeripora discoides
36		Heleopera petricola (Leidy, 1879)
37		Heleopera sphagni (Leidy, 1874)
38		Heleopera sylvatica (Penard, 1890)
39		Hyalosphenia subflava
40		Nebela collaris (Ehrenberg, 1848)
41		Nebela flabellulum
42		Nebela guttata

43		<i>Nebela tinctoria</i> (Leidy, 1879)
44		<i>Netzelia graminum</i>
45		<i>Padaungiella tubulata</i>
46		<i>Phryganella acropodia</i>
47		<i>Phryganella dissimulatrix</i>
48		<i>Phryganella paradoxa</i>
49		<i>Phryganella acropodia</i> (Hertwig & Lesser, 1874)
50		<i>Placocista lens</i>
51		<i>Placocista spinosa</i> (Penard, 1899)
52		<i>Plagiopyxis callida</i>
53		<i>Plagiopyxis labiata</i> (Penard, 1910)
54		<i>Pyxidicula operculata</i>
55		<i>Schoenbornia humicola</i> (Schönborn, 1964)
56		<i>Schwabia terricola</i> (Bonnet & Thomas, 1955)
57		<i>Tracheleuglypha acolla</i> (Bonnet and Thomas, 1955)
58		<i>Tracheleuglypha dentata</i> (Vejdovsky, 1882)
59		<i>Trigonopyxis arcuata</i>
60		<i>Trigonopyxis minuta</i>
61		<i>Trinema complanatum</i> (Penard, 1890)
62		<i>Trinema enchelys</i> (Ehrenberg, 1838)
63		<i>Trinema galeata</i>
64		<i>Trinema lineare</i> (Penard, 1890)
65		<i>Trinema penardi</i> (Thomas & Chardez, 1958)
	Тип Кольчатые черви Annelida - 4 вида	
1		<i>Nais</i> sp.
2		<i>Stylaria lacustris</i> L., 1767
3		<i>Eiseniella tetraedra</i> (Savigny, 1826)
4	Обычная рыба-пиявка, пиявица	<i>Piscicola geometra</i> (Linnaeus, 1758)
	Тип Плоские черви Plathelminthes - 71 вид	
1		<i>Crepidostomum farionis</i> (Müller, 1780) Lühe, 1999
2		<i>Crepidostomum metoecus</i> Braun, 1900
3		<i>Bunodera luciopercae</i> (Müller, 1776) Lühe, 1909
4		<i>Allocreadium isoporum</i> Looss, 1894
5		<i>Allocreadium transversale</i> (Rudolphi, 1802) Odnher, 1901
6		<i>Phyllodistomum megalorchis</i> Nybelin, 1926
7		<i>Phyllodistomum pseudofolium</i> Nybelin, 1926
8		<i>Phyllodistomum umblae</i> (Fabricius, 1780) Bakke, 1982
9		<i>Neoglyphe sobolevi</i> Schal'dybin, 1953
10		<i>Azygia lucii</i> (Müller, 1776)
11		<i>Diplostomum</i> sp. 1 mtc
12		<i>Diplostomum</i> sp. 2 mtc
13		<i>Diplostomum chromatophorum</i> (Brown, 1931) Shigin, 1986 mtc
14		<i>Diplostomum commutatum</i> (Diesing, 1850) Dubois, 1937 mtc
15		<i>Diplostomum gasterostei</i> M. O. Williams, 1966 mtc
16		<i>Diplostomum gavinum</i> (Guberlet, 1922) Hughes, 1929 mtc
17		<i>Diplostomum helveticum</i> (Dubois, 1929) Shigin, 1977 mtc
18		<i>Diplostomum huronense</i> (La Rue, 1927) Hughes, 1929 mtc

19		<i>Diplostomum mergi</i> Dubois, 1932 mtc
20		<i>Diplostomum nordmanni</i> Shigin et Sharipov, 1986 mtc
21		<i>Diplostomum paraspathaceum</i> Iles, 1959
22		<i>Diplostomum phoxini</i> Faust, 1918
23		<i>Diplostomum pseudobaeri</i> Razmashkin et Andrejuk, 1978
24		<i>Diplostomum rutili</i> (Razmashkin, 1969) mtc
25		<i>Diplostomum spathaceum</i> (Rudolphi, 1809) Braun, 1893 mtc
26		<i>Diplostomum volvens</i> Nordmann, 1832 mtc
27		<i>Tylodelphys clavata</i> (Nordmann, 1832) Diesing, 1850 mtc
28		<i>Ichthyocotylurus erraticus</i> (Rudolphi, 1809) Odening, 1969 mtc
29		<i>Ichthyocotylurus pileatus</i> Rudolphi, 1802
30		<i>Ichthyocotylurus variegatus</i> Creplin, 1825
31		<i>Ancyrocephalus percae</i> Ergens, 1966
32		<i>Dactylogyrus amphibothrium</i> Wagener, 1857
33		<i>Dactylogyrus borealis</i> Nybelin, 1936
34		<i>Tetraonchus borealis</i> (Olsson, 1893) f. <i>typical</i>
35		<i>Tetraonchus monenteron</i> Wagener, 1857
36		<i>Gyrodactylus cernuae</i> Malmberg, 1957
37		<i>Gyrodactylus lavareti</i> Malmberg, 1957
38		<i>Gyrodactylus limneus</i> Malmberg, 1964
39		<i>Gyrodactylus lotae</i> Gussev, 1953
40		<i>Gyrodactylus lucii</i> Kulakowskaja, 1951
41		<i>Gyrodactylus magnificus</i> Malmberg, 1957
42		<i>Gyrodactylus osmeri</i>
43		<i>Gyrodactylus thymalli</i> Zitnan, 1960
44		<i>Gyrodactylus truttae</i> Gläser, 1974
45		<i>Discocotyle sagittata</i> (Leuckart, 1842)
46		<i>Anoplocephaloides</i> sp.
47		<i>Paranoplocephala dentate</i> Galli-Valerio
48		<i>Paranoplocephala gracilis</i> Tenora et Murai
49		<i>Paranoplocephala omphalodes</i> Herman
50		<i>Catenotaenia cricetorum</i> Kirschenblatt, 1949
51		<i>Ditestolepis diaphana</i> (Cholodkovsky, 1906).
52		<i>Ditestolepis secunda</i> Schaldybin, 1964
53		<i>Lineolepis scutigera</i> Dujardin
54		<i>Molluscotaenia crassiscolex</i> Listow
55		<i>Neoskrjabinolepis schaldybini</i> Spassky, 1947
56		<i>Staphylocistis furcata</i> (Stüeda, 1862).
57		<i>Vigisolepis spinulosa</i> (Cholodkovsky, 1906).
58		<i>Taenia mustelae</i> Gmelin, 1790.
59		<i>Cyathocephalus truncatus</i> (Pallas, 1781)
60		<i>Triaenophorus crassus</i> Forel, 1868
61		<i>Triaenophorus nodulosus</i> (Pallas, 1781)
62		<i>Eubothrium crassum</i> (Bloch, 1779)
63		<i>Eubothrium rugosum</i> Batch, 1786
64		<i>Eubothrium salvelini</i> Schrank, 1790
65		<i>Diphyllobothrium dendriticum</i> (Nitzsch, 1824)
66		<i>Diphyllobothrium ditremum</i> (Creplin, 1825)

67	Лентец широкий	<i>Diphyllobothrium latum</i> Linnaeus, 1758
68		<i>Proteocephalus</i> l.
69		<i>Proteocephalus longicollis</i> (Zeder, 1800)
70		<i>Proteocephalus percae</i> Müller, 1780
71		<i>Proteocephalus thymalli</i> (Annenkova-Chlopina, 1923)
Тип Круглые черви Nematelminthes Schneider, 1873 - 24 вида		
1		<i>Eucoleus oesophagicola</i> Solt.
2		<i>Pseudocapillaria</i> (<i>Ichthyocapillaria</i>) <i>salvelini</i> Poljansky, 1952
3		<i>Capillaria incrassate</i> Diesing
4		<i>Capillaria kitori</i> Ruchiljadava
5		<i>Capillaria muris-sylvatici</i> Diesing
6		<i>Capillaria salvelini</i> Poljansky, 1952
7		<i>Capillaria tomentosa</i> Dujardin, 1843
8		<i>Raphidascaris acus</i> (Bloch, 1779)
9		<i>Cucullanus truttae</i> (Fabricius, 1794)
10	-	<i>Syphacia petruszewiczi</i> Bernard 1966
11	-	<i>Parastrongyloides winchesi</i> Morgan 1928
12		<i>Heligmosomoides glareoli</i> Baylis
13		<i>Heligmosomum mixtum</i> Schulz
14		<i>Longistriata codrus</i> Thomas
15		<i>Longistriata depressa</i> Dujardin
16		<i>Longistriata didas</i> Thomas
17		<i>Longistriata</i> sp. Schulz
18		<i>Comephoronema oschmarini</i> Trofimenko, 1974
19		<i>Camallanus lacustris</i> (Zoega, 1776)
20		<i>Rhabdochona denudata</i> (Dujardin, 1845)
21		<i>Cystidicoloides ephemeridarum</i> (Linstow, 1872)
22		<i>Cystidicoloides tenuissima</i> Zeder, 1800
23		<i>Cystidicola farionis</i> Fischer, 1798
24		<i>Desmidocercella numidica</i> Seurat, 1920
Тип Моллюски Mollusca Linnaeus, 1758 - 5 вида		
1		<i>Unionidae</i> sp. larva
2	Жемчужница европейская	<i>Margaritifera margaritifera</i> (Linnaeus, 1758)
3		<i>Euglesa</i> sp.
4	Речная чашечка	<i>Ancylus fluviatilis</i> O.F. Muller, 1774
		<i>Radix ovata</i> (Draparnaud, 1805)
Тип Коловратки Rotifera Cuvier, 1798 - 16 видов		
1		<i>Keratella cochlearis</i> (Gosse, 1851)
2		<i>Keratella quadrata</i> (O.F.M., 1786)
3		<i>Notholca caudate</i> Carlin
4		<i>Kellicottia longispina</i> (Kellicott, 1879)
5		<i>Euchlanis deflexa</i> (Gosse, 1851)
6		<i>Euchlanis dilatata</i> (Ehrb., 1832)
7		<i>Trichotria truncate</i> Whitelegge
8		<i>Notommata</i> sp
9		<i>Cephalodella</i> sp
10		<i>Synchaeta</i> sp

11		<i>Polyarthra dolichoptera dolichoptera</i> (Idelson, 1925)
12		<i>Polyarthra</i> sp
13		<i>Ploesoma</i> (B.) <i>hudsoni</i> (Imhof, 1891)
14		<i>Asplanchna priodonta</i> (Gosse, 1850)
15		<i>Conochilus unicornis</i> (Rousselet, 1892)
16		<i>Filinia longiseta</i> (Ehrb., 1834)
	Тип Скребни Acanthocephales - 6 видов	
1		<i>Acanthocephalus lucii</i> (Mueller, 1776)
2		<i>Echinorhynchus borealis</i> (Linstow, 1901)
3		<i>Echinorhynchus rutili</i>
4		<i>Echinorhynchus salmonis</i> Mueller, 1780
5		<i>Neoechinorhynchus crassus</i> Van Cleave, 1919
6		<i>Neoechinorhynchus rutili</i> (Mueller, 1780)
	Тип Членистоногие Arthropoda - 3105 видов	
	Класс. Паукообразные Arachnida Lamarck, 1801 - 38 вида	
1		<i>Cyrtolaelaps mucronatus</i> G. et R. Canes, 1881
2		<i>Haemogamasus nidi</i> Michael, 1892
3		<i>Haemogamasus ambulans</i> Thorell, 1872
4		<i>Hirstionyssus eusoricis</i> Bregetova, 1956
5		<i>Hirstionyssus isabellinus</i> Oudemans, 1913
6		<i>Laelaps hilaris</i> C.L. Koch, 1836
7		<i>Hyperlaelaps arvalis</i> Zachvatkin, 1948
8		<i>Eulaelaps stabularis</i> C.L. Koch, 1836
9		<i>Myonyssus ingricus</i> Bregetova, 1950
10		<i>Ixodes (Exopalgiger) trianguliceps</i> Birula, 1895
11	Ольховый войлочный клещ.	<i>Acalitus brevitarsus</i> (Fock.)
12	Ивовый галловый клещ.	<i>Acalitus tetanothrix</i> (Nal.)
13	Берёзовый галловый клещ.	<i>Aceria lionota</i> (Nal.)
14	Берёзовый беловойлочковый клещ	<i>Aceria rudis</i> (Nal.)
15	Берёзовый краснойлопочковый клещ.	<i>Aceria longisetosa</i> (Nal.)
16	Берёзовый почковый клещ	<i>Aceria calycophytia</i> (Nal.)
17	Осиновый краснойлопочковый клещ.	<i>Aceria varia</i> (Nal.)
18	Ольховый галловый клещ.	<i>Eriophyes laevis</i> (Nal.)
19	Рябиновый войлочковый клещ	<i>Eriophyes sorbeus</i> (Nal.)
20	Рябиновый галловый клещ.	<i>Eriophyes sorbi</i> (Can.)
21	Галловый клещ с костяники.	<i>Eriophyes silvicola</i> (Can.)
22	Осиновый желёзковый (бородавчатый) клещ.	<i>Eriophyes diversipunctatus</i> (Nal.)
23	Осиновый зеленовойлочковый клещ.	<i>Phyllocoptes populi</i> (Nal.)
24		<i>Acantolicosa lignaria</i> самка
25		<i>Alopecosa</i> sp. самка
26	Алопекоса валежниковая	<i>Alopecosa trabalis</i> Clerck
27	Крестовик Нордмана	<i>Araneus nordmannii</i> (Thorell, 1870)
28		<i>Araniella</i> sp. самец
29	Охотник каёмчатый	<i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1757)
30	Эварха серповидная	<i>Evarha falcata</i> самец
31		<i>Metellina</i> sp. самка
32		<i>Misumna vatia</i> самка
33	Нериена Горная	<i>Neriere montana</i> (Clerck, 1757)

34		<i>Neriere sp.</i> самка (1)
35		<i>Philodromus sp.</i> самец (1)
36		<i>Steatoda bipunctata</i> самка
37		<i>Tetragnatha sp.</i> самка (1)
38		<i>Xerolycosa nemoralis</i> самец (1)
ПОДТИП РАКООБРАЗНЫЕ CRUSTACEA Bruennich, 1772 - 56 видов, в том числе		
	Класс: Branchiopoda Latreille, 1817 Жаброногие - 26 видов	
1		<i>Diaphanosoma brachyura</i> (Liévin, 1848)
2		<i>Sida crystallina</i> (Müller, 1776)
3		<i>Holopedium gibberum</i> Zaddach, 1855
4		<i>Ceriodaphnia sp.</i>
5		<i>Daphnia cristata</i> Sars, 1861
6		<i>Daphnia cucullata</i> G.O.Sars, 1862
7		<i>Daphnia longispina</i> (Müller, 1776)
8		<i>Scapholeberis mucronata</i> (Müller, 1776)
9		<i>Alona costata</i> G.O.Sars, 1862
10		<i>Alona quadrangularis</i> (Müller, 1776)
11		<i>Alona rectangula</i> G.O.Sars, 1862
12		<i>Bosmina coregoni coregoni</i> Baird, 1857
13		<i>Bosmina coregoni lilljeborgi</i> Baird
14	Босмина длинноногая	<i>Bosmina longirostris</i> (Müller, 1776)
15		<i>Bosmina longispina</i> Leydig, 1860
16		<i>Bosmina obt. obtusirostris</i> Sars
17		<i>Bosmina obt. lacustris</i> Sars
18		<i>Bosmina kessleri</i> Uljanin
19		<i>Alonopsis elongata</i> (Sars, 1861)
20		<i>Rhynchotalona falcata</i> (Sars, 1861)
21		<i>Acroperus harpae</i> (Baird, 1836)
22		<i>Chydorus sphaericus</i> O.F. Muller
23		<i>Euchalanis dilatata</i> Ehrenberg
24		<i>Euchalanis deflexa</i> Gosse
25		<i>Leptodora kindtii</i> (Focke, 1844)
26		<i>Polyphemus pediculus</i> (Linnaeus, 1758)
	Класс Челюстеногие Maxillopoda Dahl, 1956 - 26 видов	
1		<i>Argulus coregoni</i> Thorell, 1864
2		<i>Argulus foliaceus</i> (Linnaeus, 1758)
3		<i>Eudiaptomus gracilis</i> (Sars, 1863)
4		<i>Limnocalanus macrurus</i> (Sars, 1863)
5		<i>Eurytemora lacustris</i> (Poppe, 1887)
6		<i>Heteroscope appendiculata</i> Sars, 1863
7		<i>Acanthocyclops viridis</i> Jur.
8		<i>Acanthocyclops gigas</i> Claus.
9		<i>Acanthocyclops sp.</i>
10		<i>canthocyclops languidoides</i> Lill
11		<i>Acanthocyclops nanus</i> Sars
12		<i>Cyclops lacustris</i> Sars, 1863
13		<i>Cyclops scutifer</i> Sars, 1863
14	Циклоп озёрный	<i>Cyclops strenuus</i> Fischer, 1851

15		<i>Eucyclops serrulatus</i> (Fischer, 1851)
16		<i>Eucyclops</i> sp.
17		<i>Macrocyclops albidus</i> (Jurine, 1820)
18		<i>Mesocyclops leuckarti</i> (Claus, 1857)
19		<i>Paracyclops fimbriatus</i> (Fischer, 1853)
20		<i>Thermocyclops crassus</i> (Fischer, 1853)
21		<i>Thermocyclopus oithonoides</i> Sars
22		<i>Salmincola coregonorum</i> (Kessler, 1868)
23		<i>Salmincola extensus</i> (Kessler, 1868)
24		<i>Salmincola extumescens</i> (Gadd, 1901)
25		<i>Salmincola lotae</i> Olsson, 1877
26		<i>Salmincola thymalli</i> (Kessler, 1868)
	Класс Высшие раки Malacostraca - 4 вида	
1		<i>Mysis relicta</i> Lovén, 1862
2		<i>Monoporeia affinis</i> (Lindström, 1855)
3		<i>Pontoporeia affinis</i> Lindström, 1885
4		<i>Pallasea quadrispinosa</i> Sars, 1867
	ПОДТИП ТРАХЕЙНОДЫШАЩИЕ TRACHEATA - 3022 видов, в том числе	
	Класс – Насекомые Insecta Linnaeus, 1758 - 3022 видов	
1.		<i>Caenis macrura</i> Stephens, 1835
2.		<i>Ephemera lineata</i> Eaton, 1870
3.		<i>Ephemera vulgata</i> Linnaeus, 1758
4.		<i>Heptagenia dalecarlica</i> Bengtsson, 1912
5.		<i>Heptagenia fuscogrisea</i> Retzius, 1783
6.		<i>Heptagenia sulphurea</i> (Müller, 1776)
7.		<i>Metretopus borealis</i> (Eaton, 1871)
8.		<i>Ameletus inopinatus</i> Eaton, 1887
9.		<i>Parametetus chelifera</i> Bengtsson, 1908
10.		<i>Acentrella lapponica</i> Bengtsson, 1912
11.		<i>Baetis digitatus</i> Bengtsson, 1912
12.		<i>Baetis fuscatus</i> (Linnaeus, 1761)
13.		<i>Baetis macani</i> Kimmins, 1957
14.		<i>Baetis niger</i> (Linnaeus, 1760)
15.		<i>Baetis rhodani</i> (Pictet, 1843)
16.		<i>Baetis subalpinus</i> Bengtsson, 1917
17.		<i>Baetis vernus</i> Curtis, 1834
18.		<i>Nigrobaetis niger</i> (Linnaeus, 1761)
19.		<i>Nigrobaetis pumilus</i> (Burmeister, 1839)
20.		<i>Leptophlebia marginata</i> (Linnaeus, 1767)
21.		<i>Leptophlebia vespertina</i> (Linnaeus, 1758)
22.		<i>Habrophlebia lauta</i> Eaton, 1884
23.		<i>Ephemerella aurivillii</i> (Bengtsson, 1908)
24.		<i>Ephemerella ignita</i> (Poda, 1761)
25.		<i>Ephemerella mucronata</i> (Bengtsson, 1909)
26.		<i>Caenis macrura</i> (Stephens, 1835)
27.		<i>Alainites muticus</i> (Linnaeus, 1758)
28.		<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)
29.		<i>Coenagrion hastulatum</i> (Charpentier, 1825)

30.	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)
31.	<i>Aeschna coerulea</i> (Ström, 1783)
32.	<i>Aeshna grandis</i> Linnaeus, 1758
33.	<i>Aeshna juncea</i> Linnaeus, 1758
34.	<i>Somatochlora alpestris</i> Selys, 1840
35.	<i>Somatochlora arctica</i> Zetterstedt, 1840
36.	<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)
37.	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)
38.	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758
39.	<i>Leucorrhinia dubia</i> Vander Linden, 1825
40.	<i>Leucorrhinia rubicunda</i> (Linnaeus, 1758)
41.	<i>Tetrix bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)
42.	<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)
43.	<i>Melanoplus frigidus</i> (Boheman, 1846)
44.	<i>Ectobius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)
45.	<i>Ectobius sylvestris</i> (Poda, 1761)
46.	<i>Taeniopteryx nebulosa</i> (Linnaeus, 1758)
47.	<i>Protonemura intricata</i> (Ris, 1902)
48.	<i>Amphinemura borealis</i> (Morton, 1894)
49.	<i>Amphinemura standfussi</i> (Ris, 1902)
50.	<i>Amphinemura sulcicollis</i> (Stephens, 1836)
51.	<i>Nemoura arctica</i> Esben-Petersen, 1910
52.	<i>Nemoura avicularis</i> Morton, 1894
53.	<i>Nemoura cinerea</i> (Retzius, 1783)
54.	<i>Nemoura flexuosa</i> Aubert, 1949
55.	<i>Nemurella picteti</i> Klapálek, 1900
56.	<i>Leuctra digitata</i> Kempny, 1899
57.	<i>Leuctra fusca</i> Linnaeus, 1758
58.	<i>Leuctra hippopus</i> Kempny, 1899
59.	<i>Leuctra nigra</i> (Olivier, 1811)
60.	<i>Capnia atra</i> Morton, 1896
61.	<i>Diura bicaudata</i> (Linnaeus, 1758)
62.	<i>Diura nanseni</i> (Kempny, 1900)
63.	<i>Arcynopteryx dichroa</i> (McLachlan, 1872)
64.	<i>Isogenus nubecula</i> Newman, 1833
65.	<i>Isoperla grammatica</i> (Poda, 1761)
66.	<i>Siphonoperla burmeisteri</i> (Pictet, 1841)
67.	<i>Xanthoperla apicalis bengtssoni</i> Claassen, 1936
68.	<i>Sialis fuliginosa</i> Pictet, 1836
69.	<i>Sialis lutaria</i> (Linnaeus, 1758)
70.	<i>Sialis sibirica</i> MacLachlan, 1872
71.	<i>Sialis sordida</i> Klingstedt, 1932
72.	<i>Xanthostigma xanthostigma</i> (Schummel, 1832)
73.	<i>Inocellia crassicornis</i> (Schummel, 1832)
74.	<i>Helicoconis lutea</i> (Wallengren, 1871)
75.	<i>Coniopteryx parthenia</i> (Navas et Marcet, 1910)
76.	<i>Sisyra fuscata</i> (Fabricius, 1973)
77.	<i>Micromus angulatus</i> (Stephens, 1836)

78.	<i>Micromus paganus</i> (Linnaeus, 1767)
79.	<i>Hemerobius simulans</i> Walker, 1853
80.	<i>Hemerobius humulinus</i> Linnaeus, 1758
81.	<i>Hemerobius atrifrons</i> McLachlan 1868
82.	<i>Hemerobius pini</i> Stephens, 1836
83.	<i>Hemerobius stigma</i> Stephens, 1836
84.	<i>Wesmaelius quadrifasciatus</i> (Reuter, 1894)
85.	<i>Chrysopa abbreviata</i> (Curtis, 1834)
86.	<i>Chrysopa perla</i> (Linnaeus, 1758)
87.	<i>Cixius cunicularius</i> (Linnaeus, 1767)
88.	<i>Cixius similis</i> Kirschbaum, 1868
89.	<i>Conomelus anceps</i> (Germar, 1821)
90.	<i>Tyrphodelphax albocarinatus</i> (Stål, 1858)
91.	<i>Diplocolenus limbatellus</i> (Zetterstedt, 1828)
92.	<i>Aphalara affinis</i> (Zetterstedt, 1828)
93.	<i>Aphalara calthae</i> (Linnaeus, 1761)
94.	<i>Baeopelma foersteri</i> (Flor, 1861)
95.	<i>Psylla betulaenanae</i> Ossianlsson, 1870
96.	<i>Cacopsylla ledi</i> (Flor, 1861)
97.	<i>Euceraphis punctipennis</i> (Zetterstedt, 1828)
98.	<i>Glaenocorisa propinqua cavifrons</i> (Thomson, 1869)
99.	<i>Callicorixa producta</i> (Reuter, 1880)
100.	<i>Micronecta minutissima</i> (Linnaeus, 1758)
101.	<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)
102.	<i>Closterotomus fulvomaculatus</i> (Degeer, 1773)
103.	+ <i>Dicyphus globulifer</i> (Fallén, 1829)
104.	<i>Lygocoris contaminatus</i> (Fallén, 1807)
105.	<i>Lygocoris pabulinus</i> (Linnaeus, 1761)
106.	<i>Lygus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)
107.	<i>Lygus rugulipennis</i> Poppius, 1911
108.	<i>Stenodema holsata</i> (Fabricius, 1781)
109.	+ <i>Stenodema laevigatum</i> (Linnaeus, 1758)
110.	+ <i>Adelphocoris seticornis</i> (Fabricius, 1775)
111.	<i>Trigonotylus ruficornis</i> (Geoffroy, 1785)
112.	<i>Teratocoris viridis</i> Douglas & Scott, 1867
113.	<i>Leptopterna dolabrata</i> (Linnaeus, 1758)
114.	<i>Globiceps salicicola</i> Reuter, 1880
115.	<i>Orthotylus boreellus</i> (Zetterstedt, 1828)
116.	<i>Mecomma ambulans</i> (Fallén, 1807)
117.	+ <i>Atractotomus magnicornis</i> (Fallen, 1807)

118.		<i>Psallus ambiguus</i> (Fallén, 1807)
119.		<i>Psallus graminicola</i> (Zetterstedt, 1828)
120.		<i>Monolacoris filicis</i> (Linnaeus, 1767)
121.		<i>Nabis ferus</i> (Linnaeus, 1758)
122.		<i>Anthocoris nemorum</i> (Linnaeus, 1761)
123.		<i>Elatophilus nigrellus</i> (Zetterstedt, 1838)
124.		<i>Eremocoris abietis</i> (Linnaeus, 1758)
125.		<i>Cymus glandicolor</i> Hahn, 1832
126.		<i>Eremocoris abietis</i> (Linnaeus, 1758)
127.		<i>Ligyrocoris sylvestris</i> (Linnaeus, 1758)
128.		<i>Rhyparochromus pini</i> (Linnaeus, 1758)
129.		<i>Gyrinus marinus</i> Gyllenhal, 1808
130.		<i>Brychius elevatus</i> (Panzer, 1793)
131.		<i>Haliphus confinis</i> Stephens, 1828
132.		<i>Haliphus fulvus</i> (Fabricius, 1801)
133.		<i>Haliphus lineolatus</i> Mannerheim, 1844
134.		<i>Haliphus sibiricus</i> Motschulsky, 1860
135.		<i>Haliphus varius</i> Nicolai, 1822
136.		<i>Agabus aenescens</i> Thomson, 1870
137.		<i>Agabus affinis</i> (Paykull, 1798)
138.		<i>Agabus arcticus</i> (Paykull, 1798)
139.		<i>Agabus biguttulus</i> (Thomson, 1867)
140.		<i>Agabus confinis</i> (Gyllenhal, 1808)
141.		<i>Agabus congener</i> (Thunberg, 1794)
142.		<i>Agabus erichsoni</i> (Gemminger & Harold, 1868)
143.		<i>Agabus fuliginosus</i> (Fabricius, 1792)
144.		<i>Agabus fuscipennis</i> (Paykull, 1798)
145.		<i>Agabus guttatus</i> (Paykull, 1798)
146.		<i>Agabus lapponicus</i> (Thomson, 1869)
147.		<i>Agabus serricornis</i> (Paykull, 1799)
148.		<i>Agabus subaeneus</i> Erichson, 1837

149.		<i>Agabus thomsoni</i> (J.Sahlberg, 1871)
150.		<i>Coelambus impressopunctatus</i> (Schaller, 1783)
151.		<i>Coelambus novemlineatus</i> (Stephens, 1829)
152.		<i>Deronectes latus</i> (Stephens, 1829)
153.		<i>Graptodytes granularis</i> (Linnaeus, 1767)
154.		<i>Hydroporus acutangulus</i> Thomson, 1856
155.		<i>Hydroporus erythrocephalus</i> (Linnaeus, 1758)
156.		<i>Hydroporus glabriusculus</i> Aubé, 1838
157.		<i>Hydroporus melanarius</i> Sturm, 1835
158.		<i>Hydroporus morio</i> Aubé, 1838
159.		<i>Hydroporus nigrita</i> (Fabricius, 1792)
160.		<i>Hydroporus notatus</i> Sturm, 1835
161.		<i>Hydroporus palustris</i> (Linnaeus, 1761)
162.		<i>Hydroporus rufifrons</i> (Müller, 1776)
163.		<i>Hydroporus semenovi</i> Jakowlew, 1897
164.		<i>Hydroporus striola</i> (Gyllenhal, 1826)
165.		<i>Hydroporus tristis</i> (Paykull, 1798)
166.		<i>Hydroporus umbrosus</i> (Gyllenhal, 1808)
167.		<i>Hygrotus quinquelineatus</i> (Zetterstedt, 1828)
168.		<i>Laccornis oblongus</i> (Stephens, 1835)
169.		<i>Nebrioporus assimilis</i> (Paykull, 1798)
170.		<i>Nebrioporus depressus</i> (Fabricius, 1775)
171.		<i>Oreodytes alpinus</i> (Paykull, 1798)
172.		<i>Oreodytes sanmarkii</i> (Sahlberg, 1826)
173.		<i>Oreodytes septentrionalis</i> (Gyllenhal, 1826)
174.		<i>Platambus maculatus</i> (Linnaeus, 1758)
175.		<i>Rhantus exsoletus</i> (Forster, 1771)
176.		<i>Rhantus suturellus</i> (Harris, 1828)
177.		<i>Agonum consimile</i> (Gyllenhal, 1810)
178.		<i>Agonum dolens</i> (Sahlberg, 1827)
179.		<i>Agonum fuliginosum</i> (Panzer, 1809)
180.		<i>Agonum gracile</i> Sturm, 1824

181.		<i>Agonum piceum</i> (Linnaeus, 1758)
182.		<i>Agonum sexpunctatum</i> (Linnaeus, 1758)
183.		<i>Agonum thoreyi</i> Dejean, 1828
184.		<i>Agonum viduum</i> (Panzer, 1797)
185.		<i>Amara apricaria</i> (Paykull, 1790)
186.		<i>Amara aulica</i> (Panzer, 1797)
187.		<i>Amara brunnea</i> (Gyllenhal, 1810)
188.		<i>Amara communis</i> (Panzer, 1797)
189.		<i>Amara erratica</i> (Duftschmid, 1812)
190.		<i>Amara familiaris</i> (Duftschmid, 1812)
191.		<i>Amara fulva</i> (Müller, 1776)
192.		<i>Amara interstitialis</i> Dejean, 1828
193.		<i>Amara lunicollis</i> Schiödte, 1837
194.		<i>Amara nigricornis</i> Thomson, 1857
195.		<i>Amara praetermissa</i> (Sahlberg, 1827)
196.		<i>Amara quenseli</i> (Schönherr, 1806)
197.		<i>Amara torrida</i> (Panzer, 1797)
198.		<i>Asaphidion pallipes</i> (Duftschmid, 1812)
199.		<i>Bembidion aeneum</i> Germar, 1824
200.		<i>Bembidion bipunctatum</i> (Linnaeus, 1761)
201.		<i>Bembidion bruxellense</i> Wesmael, 1835
202.		<i>Bembidion dentellum</i> (Thunberg, 1787)
203.		<i>Bembidion difficile</i> (Motschulsky, 1844)
204.		<i>Bembidion doris</i> (Panzer, 1797)
205.		<i>Bembidion grapii</i> Gyllenhal, 1827
206.		<i>Bembidion lampros</i> (Herbst, 1784)
207.		<i>Bembidion lapponicum</i> Zetterstedt, 1828
208.		<i>Bembidion litorale</i> (Olivier, 1790)
209.		<i>Bembidion obliquum</i> Sturm, 1825
210.		<i>Bembidion prasinum</i> (Duftschmid, 1812)
211.		<i>Bembidion quadrimaculatum</i> (Linnaeus, 1761)
212.		<i>Bembidion ruficolle</i> (Panzer, 1797)

213.		<i>Bembidion saxatile</i> Gyllenhal, 1827
214.		<i>Bembidion schueppelii</i> Dejean, 1831
215.		<i>Bembidion velox</i> (Linnaeus, 1761)
216.		<i>Bembidion virens</i> (Gyllenhal, 1827)
217.		<i>Bradycellus caucasicus</i> Chaudoir, 1846
218.		<i>Calathus erratus</i> (Sahlberg, 1827)
219.		<i>Calathus melanocephalus</i> (Linnaeus, 1758)
220.		<i>Calathus micropterus</i> (Duftschmid, 1812)
221.		<i>Carabus glabratus</i> Paykull, 1790
222.		<i>Carabus granulatus</i> Linnaeus, 1758
223.		<i>Carabus nitens</i> Linnaeus, 1758
224.		<i>Carabus violaceus</i> Linnaeus, 1758
225.		+ <i>Cicindela campestris</i> Linnaeus, 1758
226.		<i>Cicindela maritima</i> Dejean, 1822
227.		<i>Cicindela sylvatica</i> Linnaeus, 1758
228.		<i>Clivina fossor</i> (Linnaeus, 1758)
229.		<i>Cymindis vaporariorum</i> (Linnaeus, 1758)
230.		<i>Dicheirotichus cognatus</i> (Gyllenhal, 1827)
231.		<i>Dromius agilis</i> (Fabricius, 1787)
232.		<i>Dyschirius angustatus</i> (Ahrens, 1830)
233.		<i>Dyschirius globosus</i> (Herbst, 1784)
234.		<i>Dyschirius nigricornis</i> Motschulsky, 1844
235.		<i>Dyschirius thoracicus</i> (Rossi, 1790)
236.		<i>Elaphrus cupreus</i> Duftschmid, 1812
237.		<i>Elaphrus lapponicus</i> Gyllenhal, 1810
238.		<i>Elaphrus riparius</i> (Linnaeus, 1758)
239.		<i>Elaphrus uliginosus</i> Fabricius, 1792
240.		<i>Harpalus affinis</i> (Schränk, 1781)
241.		<i>Harpalus laevipes</i> Zetterstedt, 1828
242.		<i>Harpalus latus</i> (Linnaeus, 1758)
243.		<i>Leistus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1758)
244.		<i>Loricera pilicornis</i> (Fabricius, 1775)

245.		<i>Miscodera arctica</i> (Paykull, 1790)
246.		<i>Nebria rufescens</i> (Ström, 1768)
247.		<i>Notiophilus biguttatus</i> (Paykull, 1779)
248.		<i>Notiophilus germinyi</i> Fauvel, 1863
249.		<i>Notiophilus palustris</i> (Duftschmid, 1812)
250.		<i>Notiophilus reitteri</i> Spaeth, 1900
251.		<i>Patrobus assimilis</i> Chaudoir, 1844
252.		<i>Patrobus septentrionis</i> Dejean, 1828
253.		<i>Pelophila borealis</i> (Paykull, 1790)
254.		<i>Poecilus lepidus</i> (Leske, 1785)
255.		<i>Poecilus versicolor</i> (Sturm, 1824)
256.		<i>Pterostichus adstrictus</i> Eschscholtz, 1823
257.		<i>Pterostichus diligens</i> (Sturm, 1824)
258.		<i>Pterostichus nigrata</i> (Paykull, 1790)
259.		<i>Pterostichus oblongopunctatus</i> (Fabricius, 1787)
260.		<i>Trechus rubens</i> (Fabricius, 1792)
261.		<i>Anacaena limbata</i> (Fabricius, 1792)
262.		<i>Cercyon lateralis</i> (Marsham, 1802)
263.		<i>Cercyon melanocephalus</i> (Linnaeus, 1761)
264.		<i>Cercyon tristis</i> (Illiger, 1801)
265.		<i>Coelostoma orbiculare</i> (Fabricius, 1775)
266.		<i>Cryptopleurum minutum</i> (Fabricius, 1775)
267.		<i>Enochrus affinis</i> (Thunberg, 1794)
268.		<i>Enochrus ochropterus</i> (Marsham, 1802)
269.		<i>Enochrus quadripunctatus</i> (Herbst, 1797)
270.		<i>Helophorus pallidus</i> Gebler, 1830
271.		<i>Hydrobius fuscipes</i> (Linnaeus, 1758)
272.		<i>Laccobius minutus</i> (Linnaeus, 1758)
273.		<i>Sphaerites glabratus</i> (Fabricius, 1792)
274.		<i>Acritus minutus</i> (Herbst, 1792)
275.		<i>Hypocaccus rugiceps</i> (Duftschmid, 1805)
276.		<i>Margarinotus striola</i> (Sahlberg, 1819)

277.		<i>Paromalus parallelepipedus</i> (Herbst, 1791)
278.		<i>Platysoma lineare</i> Erichson, 1834
279.		<i>Plegaderus vulneratus</i> (Panzer, 1797)
280.		<i>Hydraena britteni</i> Joy, 1907
281.		<i>Hydraena gracilis</i> Germar, 1824
282.		<i>Ochthebius minimus</i> (Fabricius, 1792)
283.		<i>Acrotrichis fascicularis</i> (Herbst, 1793)
284.		<i>Acrotrichis grandicollis</i> (Mannerheim, 1844)
285.		<i>Acrotrichis intermedia</i> (Gillmeister, 1845)
286.		<i>Acrotrichis montandonii</i> (Allibert, 1844)
287.		<i>Acrotrichis rugulosa</i> Rosskothén, 1935
288.		<i>Acrotrichis sericans</i> (Heer, 1841)
289.		<i>Acrotrichis silvatica</i> Rosskothén, 1935
290.		<i>Acrotrichis volans</i> (Motschulsky, 1845)
291.		<i>Baeocrara variolosa</i> (Mulsant & Rey, 1867)
292.		<i>Ptilium marginatum</i> (Aubé, 1850)
293.		<i>Ptilium exaratum</i> (Allibert, 1844)
294.		<i>Pteroloma forsstromii</i> (Gyllenhal, 1810)
295.		<i>Agathidium atrum</i> (Paykull, 1798)
296.		<i>Agathidium confusum</i> Brisout De Barneville, 1863
297.		<i>Agathidium discoideum</i> Erichson, 1845
298.		<i>Agathidium laevigatum</i> Erichson, 1845
299.		<i>Agathidium nigripenne</i> (Fabricius, 1792)
300.		<i>Agathidium pisanum</i> Brisout De Barneville, 1872
301.		<i>Agathidium rotundatum</i> (Gyllenhal, 1827)
302.		<i>Agathidium seminulum</i> (Linnaeus, 1758)
303.		<i>Amphicyllus globus</i> (Fabricius, 1792)
304.		<i>Anisotoma axillaris</i> Gyllenhal, 1810
305.		<i>Anisotoma castanea</i> (Herbst, 1791)
306.		<i>Anisotoma glabra</i> (Fabricius, 1787)
307.		<i>Anisotoma humeralis</i> (Herbst, 1791)
308.		<i>Catops alpinus</i> Gyllenhal, 1827

309.		<i>Catops coracinus</i> Kellner, 1846
310.		<i>Catops morio</i> (Fabricius, 1787)
311.		+ <i>Catops nigricans</i> (Spence, 1815)
312.		<i>Catops tristis</i> (Panzer, 1793)
313.		<i>Colon pseudolatum</i> Palm, 1941
314.		<i>Colon serripes</i> (Sahlberg, 1822)
315.		<i>Cyrtusa subtestacea</i> (Gyllenhal, 1813)
316.		<i>Leiodes gyllenhali</i> Stephens, 1829
317.		<i>Leiodes longipes</i> (Schmidt, 1841)
318.		<i>Leiodes obesa</i> (Schmidt, 1841)
319.		<i>Leiodes picea</i> (Panzer, 1797)
320.		<i>Sciodrepoides watsoni</i> (Spence, 1815)
321.		<i>Eutheia linearis</i> Mulsant, 1861
322.		+ <i>Nicrophorus vespillo</i> (Linnaeus, 1758)
323.		<i>Nicrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783
324.		<i>Oiceoptoma thoracica</i> (Linnaeus, 1758)
325.		<i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758)
326.		<i>Thanatophilus lapponicus</i> (Herbst, 1793)
327.		<i>Thanatophilus rugosus</i> (Linnaeus, 1758)
328.		<i>Acrotona obfuscata</i> (Gravenhorst, 1802)
329.		<i>Acrotona pygmaea</i> (Gravenhorst, 1806)
330.		<i>Aleochara brundini</i> Bernhauer, 1936
331.		<i>Anotylus nitidulus</i> (Gravenhorst, 1802)
332.		<i>Anotylus rugosus</i> (Fabricius, 1775)
333.		<i>Anthophagus caraboides</i> (Linnaeus, 1758)
334.		<i>Anthophagus omalinus</i> Zetterstedt, 1828
335.		<i>Atheta aeneipennis</i> (Thomson, 1856)
336.		<i>Atheta graminicola</i> (Gravenhorst, 1806)
337.		<i>Atheta islandica</i> (Kraatz, 1856)
338.		<i>Atheta subtilis</i> (Scriba, 1866)
339.		<i>Atrecus pilicornis</i> (Paykull, 1790)
340.		<i>Biblopectus ambiguus</i> (Reichenbach, 1816)

341.		<i>Bledius arcticus</i> J.Sahlberg, 1890
342.		<i>Bledius defensus</i> Fauvel, 1879
343.		<i>Bledius erraticus</i> Erichson, 1839
344.		<i>Bledius subterraneus</i> Erichson, 1839
345.		<i>Bledius talpa</i> (Gyllenhal, 1810)
346.		<i>Bolitobius castaneus</i> (Stephens, 1832)
347.		<i>Bryaxis bulbifer</i> (Reichenbach, 1816)
348.		<i>Bryaxis puncticollis</i> (Denny, 1825)
349.		<i>Carpelimus corticinus</i> (Gravenhorst, 1806)
350.		<i>Creophilus maxillosus</i> (Linnaeus, 1758)
351.		<i>Dianous coerulescens</i> (Gyllenhal, 1810)
352.		<i>Drusilla canaliculata</i> (Fabricius, 1787)
353.		<i>Euaesthetus laeviusculus</i> Mannerheim, 1844
354.		<i>Euaesthetus ruficapillus</i> Lacordaire, 1835
355.		<i>Gabrius appendiculatus</i> Sharp, 1910
356.		<i>Gabrius breviventer</i> (Sperk, 1835)
357.		<i>Gabrius trossulus</i> (Nordmann, 1837)
358.		<i>Geodromicus plagiatus</i> (Fabricius, 1798)
359.		<i>Ischnopoda atra</i> (Gravenhorst, 1806)
360.		<i>Ischnosoma longicorne</i> (Mäklin, 1847)
361.		<i>Ischnosoma splendidum</i> (Gravenhorst, 1806)
362.		<i>Lathrobium quadratum</i> (Paykull, 1789)
363.		<i>Lathrobium rufipenne</i> Gyllenhal, 1813
364.		<i>Lathrobium terminatum</i> Gravenhorst, 1802
365.		<i>Mannerheimia arctica</i> (Erichson, 1840)
366.		<i>Mniusa grandiceps</i> (J.Sahlberg, 1876)
367.		<i>Mycetoporus boreellus</i> J.Sahlberg, 1876
368.		<i>Mycetoporus tenuis</i> Mulsant & Rey, 1853
369.		<i>Myllaena minuta</i> (Gravenhorst, 1806)
370.		<i>Nudobius lentus</i> (Gravenhorst, 1806)
371.		<i>Othius lapidicola</i> Kiesenwetter, 1848
372.		<i>Othius volans</i> J.Sahlberg, 1876

373.		<i>Oxytelus laqueatus</i> (Marsham, 1802)
374.		<i>Philhygra arctica</i> (Thomson, 1856)
375.		<i>Philhygra deformis</i> (Kraatz, 1856)
376.		<i>Philonthus atratus</i> (Gravenhorst, 1802)
377.		<i>Philonthus carbonarius</i> (Gravenhorst, 1810)
378.		<i>Philonthus furcifer</i> (Renkonen, 1937)
379.		<i>Philonthus marginatus</i> (Ström, 1768)
380.		<i>Philonthus parvicornis</i> (Gravenhorst, 1802)
381.		<i>Philonthus rotundicollis</i> (Ménétries, 1832)
382.		<i>Philonthus succicola</i> Thomson, 1860
383.		<i>Philonthus varians</i> (Paykull, 1789)
384.		<i>Phloeonomus pusillus</i> (Gravenhorst, 1806)
385.		<i>Phloeonomus sjobergi</i> Strand, 1937
386.		<i>Phloeopora testacea</i> (Mannerheim, 1830)
387.		<i>Phloeostibia lapponica</i> (Zetterstedt, 1838)
388.		<i>Placusa complanata</i> Erichson, 1839
389.		<i>Placusa depressa</i> Mäklin, 1845
390.		<i>Placusa incompleta</i> Sjöberg, 1934
391.		<i>Placusa tachyporoides</i> (Waltl, 1838)
392.		<i>Platystethus arenarius</i> (Fourcroy, 1785)
393.		<i>Pselaphaulax dresdensis</i> (Herbst, 1792)
394.		<i>Pselaphus heisei</i> Herbst, 1792
395.		<i>Quedius fuliginosus</i> (Gravenhorst, 1802)
396.		<i>Quedius plagiatus</i> (Mannerheim, 1843)
397.		<i>Quedius umbrinus</i> Erichson, 1839
398.		<i>Scaphisoma agaricinum</i> (Linnaeus, 1758)
399.		+ <i>Scaphisoma boreale</i> Lundblad, 1952
400.		<i>Scaphisoma subalpinum</i> Reitter, 1880
401.		<i>Stenus ampliventris</i> J.Sahlberg, 1890
402.		<i>Stenus biguttatus</i> (Linnaeus, 1758)
403.		<i>Stenus carbonarius</i> Gyllenhal, 1827
404.		<i>Stenus cautus</i> Erichson, 1839

405.		<i>Stenus clavicornis</i> (Scopoli, 1763)
406.		<i>Stenus coarcticollis</i> Eppelsheim, 1890
407.		<i>Stenus excubitor</i> Erichson, 1839
408.		<i>Stenus junco</i> (Paykull, 1789)
409.		<i>Stenus nanus</i> Stephens, 1833
410.		<i>Stenus palposus</i> Zetterstedt, 1828
411.		<i>Stenus palustris</i> Erichson, 1839
412.		<i>Stenus proditor</i> Erichson, 1839
413.		<i>Stenus providus</i> Erichson, 1839
414.		<i>Stenus pumilio</i> Erichson, 1839
415.		<i>Stenus ruralis</i> Erichson, 1840
416.		<i>Stenus scabriculus</i> J.Sahlberg, 1876
417.		<i>Stenus tarsalis</i> Ljungh, 1804
418.		<i>Tachinus laticollis</i> Gravenhorst, 1802
419.		<i>Tachinus proximus</i> Kraatz, 1855
420.		<i>Tachinus signatus</i> Gravenhorst, 1802
421.		<i>Tachyporus atriceps</i> Stephens, 1832
422.		<i>Tachyporus pulchellus</i> Mannerheim, 1857
423.		<i>Thinobius longipennis</i> (Heer, 1841)
424.		<i>Platycerus caprea</i> (De Geer, 1774)
425.		<i>Geotrupes stercorarius</i> (Linnaeus, 1758)
426.		<i>Aegialia sabuleti</i> (Panzer, 1797)
427.		<i>Aphodius ater</i> (De Geer, 1774)
428.		<i>Aphodius borealis</i> Gyllenhal, 1827
429.		<i>Aphodius fimetarius</i> (Linnaeus, 1758)
430.		<i>Aphodius haemorrhoidalis</i> (Linnaeus, 1758)
431.		<i>Aphodius lapponum</i> Gyllenhal, 1806
432.		<i>Aphodius piceus</i> Gyllenhal, 1808
433.		<i>Aphodius pusillus</i> (Herbst, 1789)
434.		<i>Aphodius rufipes</i> (Linnaeus, 1758)
435.		<i>Aphodius rufus</i> (Moll, 1782)
436.		<i>Aphodius sordidus</i> (Fabricius, 1775)

437.		<i>Cetonia aurata</i> (Linnaeus, 1758)
438.		<i>Oryctes nasicornis</i> (Linnaeus, 1758)
439.		<i>Protaetia cuprea metallica</i> (Herbst, 1786)
440.		<i>Trichius fasciatus</i> (Linnaeus, 1758)
441.		<i>Clambus punctulum</i> (Beck, 1817)
442.		*+ <i>Contacyphon laevipennis</i> Tournier, 1868
443.		<i>Contacyphon padi</i> (Linnaeus, 1758)
444.		<i>Contacyphon punctipennis</i> Sharp, 1872
445.		? <i>Contacyphon variabilis</i> (Thunberg, 1787)
446.		<i>Cyphon ochraceus</i> Stephens, 1830
447.		<i>Cyphon pubescens</i> (Fabricius, 1792)
448.		<i>Elodes minuta</i> (Linnaeus, 1767)
449.		<i>Agrilus paludicola</i> Krogerus, 1922
450.		<i>Anthaxia quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)
451.		<i>Buprestis rustica</i> Linnaeus, 1758
452.		<i>Phaenops cyanea</i> (Fabricius, 1775)
453.		<i>Byrrhus fasciatus</i> Forster, 1771
454.		<i>Byrrhus pilula</i> (Linnaeus, 1758)
455.		<i>Byrrhus pustulatus</i> Forster, 1771
456.		<i>Curimopsis cyclolepidia</i> (Münster, 1902)
457.		<i>Curimopsis paleata</i> (Erichson, 1846)
458.		<i>Cytilus auricomus</i> (Duftschmid, 1825)
459.		<i>Cytilus sericeus</i> (Forster, 1771)
460.		<i>Simplocaria semistriata</i> (Fabricius, 1794)
461.		<i>Elmis aenea</i> (Müller, 1806)
462.		<i>Elmis maugetii</i> Latreille, 1798
463.		<i>Limnius volckmari</i> (Panzer, 1793)
464.		<i>Normandia nitens</i> (Müller, 1817)
465.		<i>Oulimnius tuberculatus</i> (Müller, 1806)
466.		<i>Riolus nitens</i> (Müller, 1817)
467.		<i>Dryops ernesti</i> Des Gozis, 1886
468.		<i>Actenicerus sjaelandicus</i> (Müller, 1764)

469.		<i>Agriotes obscurus</i> (Linnaeus, 1758)
470.		<i>Ampedus balteatus</i> (Linnaeus, 1758)
471.		? <i>Ampedus nigrinus</i> (Herbst, 1784)
472.		<i>Ampedus tristis</i> (Linnaeus, 1758)
473.		<i>Aplotarsus incanus</i> (Gyllenhal, 1827)
474.		<i>Ascoliocerus hyperboreus</i> (Gyllenhal, 1827)
475.		<i>Athous subfuscus</i> (Müller, 1764)
476.		<i>Cidnopus aeruginosus</i> (Olivier, 1790)
477.		<i>Ctenicera cuprea</i> (Fabricius, 1775)
478.		<i>Ctenicera pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)
479.		<i>Dalopius marginatus</i> (Linnaeus, 1758)
480.		<i>Danosoma conspersum</i> (Gyllenhal, 1808)
481.		+ <i>Danosoma fasciatum</i> (Linnaeus, 1758)
482.		<i>Denticollis linearis</i> (Linnaeus, 1758)
483.		<i>Diacanthous undulatus</i> (De Geer, 1774)
484.		<i>Eanus costalis</i> (Paykull, 1800)
485.		<i>Fleutiauxellus algidus</i> (J.Sahlberg, 1883)
486.		<i>Hypnoidus riparius</i> (Fabricius, 1792)
487.		<i>Hypnoidus rivularius</i> (Gyllenhal, 1808)
488.		<i>Limonium aeneoniger</i> (De Geer, 1774)
489.		<i>Liotrichus affinis</i> (Paykull, 1800)
490.		<i>Melanotus castanipes</i> (Paykull, 1800)
491.		<i>Negastrius pulchellus</i> (Linnaeus, 1761)
492.		<i>Neohypdonus arcticus</i> (Candeze, 1860)
493.		<i>Orithales serraticornis</i> (Paykull, 1800)
494.		<i>Prosternon tessellatum</i> (Linnaeus, 1758)
495.		<i>Selatosomus aeneus</i> (Linnaeus, 1758)
496.		<i>Selatosomus cruciatus</i> (Linnaeus, 1758)
497.		<i>Selatosomus impressus</i> (Fabricius, 1792)
498.		<i>Selatosomus melancholicus</i> (Fabricius, 1798)
499.		<i>Sericus brunneus</i> (Linnaeus, 1758)
500.		<i>Zorochros minimus</i> (Lacordaire, 1835)

501.		<i>Dictyoptera aurora</i> (Herbst, 1784)
502.		<i>Cantharis figurata</i> Mannerheim, 1843
503.		<i>Cantharis flavilabris</i> Fallén, 1807
504.		<i>Cantharis paludosa</i> Fallén, 1807
505.		<i>Malthodes brevicollis</i> (Paykull, 1798)
506.		<i>Malthodes flavoguttatus</i> Kiesenwetter, 1852
507.		<i>Malthodes fuscus</i> (Waltl, 1838)
508.		<i>Malthodes maurus</i> (Laporte De Castelnau, 1840) Platonoff, 1943
509.		<i>Malthodes mysticus</i> Kiesenwetter, 1852
510.		<i>Malthodes pumilus</i> (Brebbison, 1835)
511.		<i>Malthodes spathifer</i> Kiesenwetter, 1852
512.		<i>Podabrus alpinus</i> (Paykull, 1798)
513.		<i>Podabrus lapponicus</i> (Gyllenhal, 1810)
514.		<i>Podistra rufotestacea</i> (Letzner, 1845)
515.		<i>Podistra schoenherri</i> (Dejean, 1837)
516.		<i>Rhagonycha atra</i> (Linnaeus, 1767)
517.		<i>Rhagonycha elongata</i> (Fallén, 1807)
518.		<i>Rhagonycha nigriventris</i> Motschulsky, 1860
519.		<i>Rhagonycha testacea</i> (Linnaeus, 1758)
520.		<i>Stephanopachys substriatus</i> (Paykull, 1800)
521.		<i>Anobium thomsoni</i> (Kraatz, 1881)
522.		<i>Episernus angulicollis</i> Thomson, 1863
523.		<i>Ernobius explanatus</i> (Mannerheim, 1843)
524.		<i>Hadrobregmus pertinax</i> (Linnaeus, 1758)
525.		<i>Priobium carpini</i> (Herbst, 1793)
526.		<i>Hylecoetus dermestoides</i> (Linnaeus, 1761)
527.		<i>Hylecoetus flabellicornis</i> (Schneider, 1791)
528.		<i>Ostoma ferruginea</i> (Linnaeus, 1758)
529.		<i>Necrobia violacea</i> (Linnaeus, 1758)
530.		<i>Thanasimus femoralis</i> (Zetterstedt, 1828)
531.		<i>Thanasimus formicarius</i> (Linnaeus, 1758)
532.		<i>Dasytes niger</i> (Linnaeus, 1761)

533.		<i>Dasytes obscurus</i> Gyllenhal, 1813
534.		<i>Dolichosoma lineare</i> (Rossi, 1791)
535.		<i>Nepachys cardiacae</i> (Linnaeus, 1761)
536.		+ <i>Aspidiphorus orbiculatus</i> (Gyllenhal, 1808)
537.		<i>Sphindus dubius</i> (Gyllenhal, 1808)
538.		<i>Kateretes pusillus</i> (Thunberg, 1794)
539.		<i>Epuraea aestiva</i> (Linnaeus, 1758)
540.		<i>Epuraea angustula</i> Sturm, 1844
541.		<i>Epuraea biguttata</i> (Thunberg, 1784)
542.		<i>Epuraea boreella</i> (Zetterstedt, 1828)
543.		<i>Epuraea contractula</i> J.Sahlberg, 1889
544.		<i>Epuraea deubeli</i> Reitter, 1898
545.		<i>Epuraea fussii</i> Reitter, 1885
546.		<i>Epuraea laeviuscula</i> (Gyllenhal, 1827)
547.		<i>Epuraea marseuli</i> Reitter, 1873
548.		<i>Epuraea pallescens</i> (Stephens, 1832)
549.		<i>Epuraea placida</i> Mäklin, 1853
550.		<i>Epuraea silacea</i> (Herbst, 1784)
551.		<i>Epuraea variegata</i> (Herbst, 1793)
552.		+ <i>Nitidula bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)
553.		<i>Glischrochilus hortensis</i> (Geoffroy, 1785)
554.		<i>Glischrochilus quadripunctatus</i> (Linnaeus, 1758)
555.		<i>Ipidia binotata</i> Reitter, 1875
556.		<i>Meligethes atratus</i> (Olivier, 1790)
557.		<i>Omosita colon</i> (Linnaeus, 1758)
558.		<i>Omosita depressa</i> (Linnaeus, 1758)
559.		<i>Pityophagus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1761)
560.		<i>Pocadius ferrugineus</i> (Fabricius, 1775)
561.		<i>Rhizophagus bipustulatus</i> (Fabricius, 1792)
562.		<i>Rhizophagus depressus</i> (Fabricius, 1792)
563.		<i>Rhizophagus dispar</i> (Paykull, 1800)
564.		<i>Rhizophagus fenestralis</i> (Linnaeus, 1758)

565.		<i>Rhizophagus ferrugineus</i> (Paykull, 1800)
566.		<i>Dendrophagus crenatus</i> (Paykull, 1799)
567.		<i>Silvanus unidentatus</i> (Olivier, 1790)
568.		<i>Uleiota planata</i> (Linnaeus, 1761)
569.		<i>Pediacus fuscus</i> Erichson, 1845
570.		<i>Cryptolestes abietis</i> (Wankowicz, 1865)
571.		<i>Olibrus aeneus</i> (Fabricius, 1792)
572.		<i>Olibrus bimaculatus</i> Küster, 1848
573.		<i>Phalacrus nigrinus</i> Marsham, 1802
574.		<i>Phalacrus substriatus</i> Gyllenhal, 1813
575.		<i>Atomaria alpina</i> Heer, 1841
576.		<i>Atomaria analis</i> Erichson, 1846
577.		<i>Atomaria fuscata</i> (Schönherr, 1808)
578.		<i>Atomaria fuscipes</i> (Gyllenhal, 1808)
579.		<i>Atomaria nigrirostris</i> Stephens, 1830
580.		<i>Atomaria vespertina</i> Mäklin, 1853
581.		<i>Atomaria zetterstedti</i> (Zetterstedt, 1838)
582.		<i>Caenoscelis ferruginea</i> (Sahlberg, 1820)
583.		<i>Cryptophagus badius</i> Sturm, 1845
584.		<i>Cryptophagus scanicus</i> (Linnaeus, 1758)
585.		<i>Cryptophagus tuberculosus</i> Mäklin, 1852
586.		<i>Micrambe abietis</i> (Paykull, 1798)
587.		<i>Dacne bipustulata</i> (Thunberg, 1781)
588.		<i>Triplax aenea</i> (Schaller, 1783)
589.		<i>Triplax russica</i> (Linnaeus, 1758)
590.		<i>Triplax scutellaris</i> Charpentier, 1825
591.		<i>Byturus tomentosus</i> (De Geer, 1774)
592.		<i>Cerylon deplanatum</i> Gyllenhal, 1827
593.		<i>Cerylon ferrugineum</i> Stephens, 1830
594.		<i>Cerylon histeroideus</i> (Fabricius, 1792)
595.		<i>Endomychus coccineus</i> (Linnaeus, 1758)
596.		<i>Mycetaea subterranea</i> (Fabricius, 1801)

597.		<i>Adalia bipunctata bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)
598.		<i>Adalia bipunctata frigida</i> (Schneider, 1792)
599.		<i>Anisosticta strigata</i> (Thunberg, 1795)
600.		<i>Calvia quatuordecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)
601.		<i>Coccinella hieroglyphica</i> Linnaeus, 1758
602.		<i>Coccinella magnifica</i> Redtenbacher, 1843
603.		<i>Coccinella quinquepunctata</i> Linnaeus, 1758
604.		<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758
605.		<i>Coccinella trifasciata</i> Linnaeus, 1758
606.		<i>Hippodamia septemmaculata</i> (De Geer, 1775)
607.		+ <i>Myrrha octodecimguttata</i> (Linnaeus, 1758)
608.		+ <i>Myzia oblongoguttata</i> (Linnaeus, 1758)
609.		<i>Nephus redtenbacheri</i> (Mulsant, 1846)
610.		<i>Scymnus fennicus</i> J.Sahlberg, 1886
611.		<i>Scymnus haemorrhoidalis</i> Herbst, 1797
612.		<i>Scymnus nigrinus</i> Kugelann, 1794
613.		<i>Scymnus suturalis</i> Thunberg, 1795
614.		<i>Orthoperus brunnipes</i> (Gyllenhal, 1808)
615.		? <i>Orthoperus punctatus</i> Wankowicz, 1865
616.		<i>Corticaria ferruginea</i> Marsham, 1802
617.		<i>Corticaria impressa</i> (Olivier, 1790)
618.		<i>Corticaria interstitialis</i> Mannerheim, 1844
619.		<i>Corticaria lapponica</i> (Zetterstedt, 1838)
620.		<i>Corticaria longicollis</i> (Zetterstedt, 1838)
621.		<i>Corticaria pubescens</i> (Gyllenhal, 1827)
622.		<i>Corticaria rubripes</i> Mannerheim, 1844
623.		<i>Corticaria saginata</i> Mannerheim, 1844
624.		<i>Corticaria umbilicata</i> (Beck, 1817)
625.		<i>Corticarina latipennis</i> (J.Sahlberg, 1871)
626.		<i>Corticarina minuta</i> (Fabricius, 1792)
627.		*+ <i>Corticarina parvula</i> (Mannerheim, 1844)
628.		<i>Corticinara gibbosa</i> (Herbst, 1793)

629.		<i>Enicmus histrio</i> Joy & Tomlin, 1910
630.		<i>Enicmus rugosus</i> (Herbst, 1793)
631.		<i>Latridius consimilis</i> Mannerheim, 1844
632.		<i>Latridius minutus</i> (Linnaeus, 1767)
633.		<i>Stephostethus variolosus</i> (Mannerheim, 1844)
634.		<i>Cis boleti</i> (Scopoli, 1763)
635.		<i>Cis comptus</i> Gyllenhal, 1827
636.		<i>Cis jacquemartii</i> Mellié, 1848
637.		<i>Octotemnus glabriculus</i> (Gyllenhal, 1827)
638.		*+ <i>Ropalodontus perforatus</i> (Gyllenhal, 1813)
639.		<i>Ropalodontus strandi</i> Lohse, 1969
640.		<i>Tetratoma ancora</i> Fabricius, 1790
641.		<i>Melandrya dubia</i> (Schaller, 1783)
642.		+ <i>Orchesia fasciata</i> (Illiger, 1798)
643.		<i>Orchesia micans</i> (Panzer, 1794)
644.		<i>Xylita laevigata</i> (Hellenius, 1786)
645.		<i>Mordellistena parvula</i> (Gyllenhal, 1827)
646.		<i>Lasconotus jelskii</i> (Wankowicz, 1867)
647.		<i>Orthocerus clavicornis</i> (Linnaeus, 1758)
648.		<i>Bius thoracicus</i> (Fabricius, 1792)
649.		<i>Bolitophagus reticulatus</i> (Linnaeus, 1767)
650.		<i>Corticeus longulus</i> (Gyllenhal, 1827)
651.		<i>Diaperis boleti</i> (Linnaeus, 1758)
652.		<i>Mycetochara obscura</i> (Zetterstedt, 1838)
653.		<i>Tenebrio molitor</i> (Linnaeus, 1758)
654.		<i>Oedemera virescens</i> (Linnaeus, 1767)
655.		<i>Meloe violaceus</i> Marsham, 1802
656.		<i>Boros schneideri</i> (Panzer, 1795)
657.		<i>Pytho abieticola</i> J.Sahlberg, 1875
658.		<i>Pytho depressus</i> (Linnaeus, 1767)
659.		<i>Pytho kolwensis</i> Sahlberg, 1833
660.		<i>Rabocerus foveolatus</i> (Ljung, 1823)

661.		<i>Anthicus flavipes</i> (Panzer, 1797)
662.		<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)
663.		<i>Anaspis arctica</i> Zetterstedt, 1828
664.		<i>Anaspis frontalis</i> (Linnaeus, 1758)
665.		<i>Anaspis marginicollis</i> Lindberg, 1925
666.		<i>Anaspis thoracica</i> (Linnaeus, 1758)
667.		<i>Acanthocinus aedilis</i> (Linnaeus, 1758)
668.		<i>Acmaeops pratensis</i> (Laicharting, 1784)
669.		<i>Acmaeops septentrionis</i> (Thomson, 1866)
670.		<i>Acmaeops smaragdula</i> (Fabricius, 1792)
671.		<i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer, 1775)
672.		<i>Anastrangalia reyi</i> (Heyden, 1889)
673.		<i>Anastrangalia sanguinolenta</i> (Linnaeus, 1761)
674.		<i>Anoplodera virens</i> (Linnaeus, 1758)
675.		<i>Arhopalus rusticus</i> (Linnaeus, 1758)
676.		<i>Asemum striatum</i> (Linnaeus, 1758)
677.		<i>Brachyta interrogationis</i> (Linnaeus, 1758)
678.		+ <i>Callidium coriaceum</i> (Paykull, 1800)
679.		<i>Callidium violaceum</i> (Linnaeus, 1758)
680.		<i>Evodinus borealis</i> (Gyllenhal, 1827)
681.		<i>Gaurotes virginea</i> (Linnaeus, 1758)
682.		<i>Judolia sexmaculata</i> (Linnaeus, 1758)
683.		<i>Leptura quadrifasciata</i> Linnaeus, 1758
684.		<i>Lepturalia nigripes</i> (De Geer, 1775)
685.		<i>Molorchus minor</i> (Linnaeus, 1758)
686.		<i>Monochamus sutor</i> (Linnaeus, 1758)
687.		<i>Necydalis major</i> Linnaeus, 1758
688.		<i>Nivellia extensa</i> (Gebler, 1841)
689.		<i>Oxymirus cursor</i> (Linnaeus, 1758)
690.		<i>Pachyta lamed</i> (Linnaeus, 1758)
691.		<i>Pogonocherus fasciculatus</i> (De Geer, 1775)
692.		<i>Rhagium inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)

693.		<i>Rhagium mordax</i> (De Geer, 1775)
694.		<i>Saperda populnea</i> (Linnaeus, 1758)
695.		<i>Tetropium castaneum</i> (Linnaeus, 1758)
696.		+ <i>Tetropium fuscum</i> (Fabricius, 1787)
697.		<i>Altica ericeti</i> (Allard, 1859)
698.		<i>Altica oleracea</i> (Linnaeus, 1758)
699.		<i>Altica opacifrons</i> Lindberg, 1938
700.		<i>Altica palustris</i> Weise, 1888
701.		<i>Aphthona erichsoni</i> (Zetterstedt, 1838)
702.		<i>Bromius obscurus</i> (Linnaeus, 1758)
703.		<i>Calomicrus pinicola</i> (Duftschmid, 1825)
704.		<i>Cassida rubiginosa</i> Müller, 1776
705.		<i>Chaetocnema sahlbergii</i> (Gyllenhal, 1827)
706.		<i>Chrysolina graminis</i> (Linnaeus, 1758)
707.		<i>Chrysolina marginata</i> (Linnaeus, 1758)
708.		<i>Chrysolina staphylaea</i> (Linnaeus, 1758)
709.		<i>Chrysomela collaris</i> Linnaeus, 1758
710.		<i>Chrysomela cuprea</i> Fabricius, 1775
711.		<i>Chrysomela lapponica</i> Linnaeus, 1758
712.		<i>Clytra quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)
713.		<i>Cryptocephalus aureolus</i> Suffrian, 1847
714.		<i>Cryptocephalus decemmaculatus</i> (Linnaeus, 1758)
715.		<i>Cryptocephalus distinguendus</i> Schneider, 1792
716.		<i>Cryptocephalus labiatus</i> (Linnaeus, 1761)
717.		<i>Cryptocephalus quadripustulatus</i> Gyllenhal, 1813
718.		<i>Cryptocephalus querceti</i> Suffrian, 1848
719.		<i>Cryptocephalus sexpunctatus</i> (Linnaeus, 1758)
720.		<i>Donacia antiqua</i> Kunze, 1818
721.		<i>Donacia aquatica</i> (Linnaeus, 1758)
722.		<i>Donacia brevitarsis</i> Thomson, 1884
723.		<i>Donacia impressa</i> Paykull, 1799
724.		<i>Donacia obscura</i> Gyllenhal, 1813

725.		<i>Galeruca tanacetii</i> (Linnaeus, 1758)
726.		<i>Galerucella nymphaeae</i> (Linnaeus, 1758)
727.		<i>Gonioctena arctica</i> Mannerheim, 1853
728.		<i>Gonioctena decemnotata</i> (Marsham, 1802)
729.		<i>Gonioctena linnaeana</i> (Schrank, 1781)
730.		<i>Gonioctena pallida</i> (Linnaeus, 1758)
731.		<i>Gonioctena quinquepunctata</i> (Fabricius, 1787)
732.		<i>Gonioctena viminalis</i> (Linnaeus, 1758)
733.		<i>Hippuriphila modeeri</i> (Linnaeus, 1761)
734.		<i>Lochmaea caprea</i> (Linnaeus, 1758)
735.		<i>Lochmaea suturalis</i> (Thomson, 1866)
736.		<i>Luperus longicornis</i> (Fabricius, 1781)
737.		<i>Neocrepidodera femorata</i> (Gyllenhal, 1813)
738.		<i>Phaedon armoraciae</i> (Linnaeus, 1758)
739.		<i>Phaedon cochleariae</i> (Fabricius, 1792)
740.		<i>Phaedon concinnus</i> (Stephens, 1831)
741.		<i>Phratora laticollis</i> (Suffrian, 1851)
742.		<i>Phratora polaris</i> (Sparre Schneider, 1886)
743.		<i>Phratora vitellinae</i> (Linnaeus, 1758)
744.		<i>Phratora vulgatissima</i> (Linnaeus, 1758)
745.		<i>Phyllotreta flexuosa</i> (Illiger, 1794)
746.		<i>Phyllotreta striolata</i> (Fabricius, 1803)
747.		<i>Phyllotreta undulata</i> Kutschera, 1860
748.		<i>Plagiodera versicolora</i> (Laicharting, 1781)
749.		<i>Plagiosterna aenea</i> (Linnaeus, 1758)
750.		<i>Plateumaris discolor</i> (Herbst, 1795)
751.		<i>Plateumaris sericea</i> (Linnaeus, 1758)
752.		<i>Syneta betulae</i> (Fabricius, 1792)
753.		<i>Cimberis attelaboides</i> (Fabricius, 1787)
754.		<i>Gonotropis dorsalis</i> (Thunberg, 1796)
755.		<i>Platyrhinus resinosus</i> (Scopoli, 1763)
756.		<i>Apoderus coryli</i> (Linnaeus, 1758)

757.		<i>Byctiscus betulae</i> (Linnaeus, 1758)
758.		<i>Byctiscus populi</i> (Linnaeus, 1758)
759.		<i>Deporaus betulae</i> (Linnaeus, 1758)
760.		<i>Deporaus mannerheimi</i> (Hummel, 1823)
761.		<i>Temnocerus nanus</i> (Paykull, 1792)
762.		<i>Apion assimile</i> Kirby, 1808
763.		<i>Apion frumentarium</i> (Linnaeus, 1758)
764.		<i>Apion fulvipes</i> (Geoffroy, 1785)
765.		<i>Anoplus plantaris</i> (Naezen, 1794)
766.		<i>Anthonomus phyllocola</i> (Herbst, 1795)
767.		<i>Anthonomus rubi</i> (Herbst, 1795)
768.		<i>Archarius crux</i> Fabricius, 1777
769.		<i>Ceutorhynchus querceti</i> (Gyllenhal, 1813)
770.		<i>Ceutorhynchus typhae</i> (Herbst, 1795)
771.		<i>Coeliodinus nigratarsis</i> Hartmann, 1895
772.		<i>Coeliodinus rubicundus</i> (Herbst, 1795)
773.		<i>Cryphalus saltuarius</i> Weise, 1891
774.		<i>Cryptorhynchus lapathi</i> (Linnaeus, 1758)
775.		<i>Crypturgus cinereus</i> (Herbst, 1793)
776.		<i>Crypturgus pusillus</i> (Gyllenhal, 1813)
777.		<i>Crypturgus subcribrosus</i> Eggers, 1933
778.		<i>Dendroctonus micans</i> (Kugelann, 1794)
779.		<i>Dorytomus edoughensis</i> Desbrochers Des Loges, 1875
780.		<i>Dorytomus salicis</i> Walton, 1851
781.		<i>Dorytomus taeniatus</i> (Fabricius, 1781)
782.		<i>Dryocoetes autographus</i> (Ratzeburg, 1837)
783.		<i>Dryocoetes hectographus</i> Reitter, 1913
784.		<i>Grypus equiseti</i> (Fabricius, 1775)
785.		<i>Hylastes ater</i> (Fabricius, 1792)
786.		<i>Hylastes brunneus</i> Erichson, 1836
787.		<i>Hylastes cunicularius</i> Erichson, 1836
788.		+ <i>Hylastes opacus</i> Erichson, 1836

789.		<i>Hylobius abietis</i> (Linnaeus, 1758)
790.		<i>Hylobius excavatus</i> Laicharting, 1781
791.		<i>Hylurgops glabratus</i> (Zetterstedt, 1828)
792.		<i>Hylurgops palliatus</i> (Gyllenhal, 1813)
793.		<i>Hypera arator</i> (Linnaeus, 1758)
794.		<i>Hypera rumicis</i> (Linnaeus, 1758)
795.		<i>Hypera suspiciosa</i> (Herbst, 1795)
796.		<i>Ips acuminatus</i> (Gyllenhal, 1827)
797.		<i>Ips amitinus</i> (Eichhoff, 1872)
798.		<i>Ips sexdentatus</i> (Börner, 1776)
799.		<i>Ips typographus</i> (Linnaeus, 1758)
800.		<i>Isochnus foliorum</i> (Müller, 1764)
801.		<i>Limnobaris dolorosa</i> (Goeze, 1777)
802.		<i>Limnobaris t-album</i> (Linnaeus, 1758)
803.		<i>Limobius borealis</i> (Paykull, 1792)
804.		<i>Magdalis carbonaria</i> (Linnaeus, 1758)
805.		<i>Magdalis duplicata</i> Germar, 1819
806.		<i>Magdalis frontalis</i> (Gyllenhal, 1827)
807.		<i>Magdalis nitida</i> (Gyllenhal, 1827)
808.		<i>Miarus campanulae</i> (Linnaeus, 1767)
809.		<i>Notaris acridulus</i> (Linnaeus, 1758)
810.		<i>Notaris aethiops</i> (Fabricius, 1792)
811.		<i>Orthotomicus proximus</i> (Eichhoff, 1868)
812.		<i>Orthotomicus suturalis</i> (Gyllenhal, 1827)
813.		<i>Otiorhynchus nodosus</i> (Müller, 1764)
814.		<i>Otiorhynchus ovatus</i> (Linnaeus, 1758)
815.		<i>Pelenomus velaris</i> (Gyllenhal, 1827)
816.		<i>Phloeotribus spinulosus</i> (Rey, 1883)
817.		<i>Pissodes gyllenhalii</i> (Sahlberg, 1834)
818.		<i>Pissodes harcyniae</i> (Herbst, 1795)
819.		<i>Pissodes pini</i> (Linnaeus, 1758)
820.		<i>Pissodes piniphilus</i> (Herbst, 1797)

821.		<i>Pityogenes bidentatus</i> (Herbst, 1783)
822.		<i>Pityogenes chalcographus</i> (Linnaeus, 1760)
823.		<i>Pityogenes irkutensis</i> Eggers, 1910
824.		<i>Pityogenes quadridens</i> (Hartig, 1834)
825.		<i>Pityogenes saalasi</i> Eggers, 1914
826.		<i>Pityophthorus lichtensteinii</i> (Ratzeburg, 1837)
827.		<i>Pityophthorus micrographus</i> (Linnaeus, 1758)
828.		<i>Pityophthorus tragardhi</i> Spessivtseff, 1921
829.		<i>Polydrusus fulvicornis</i> (Fabricius, 1792)
830.		<i>Polydrusus tereticollis</i> (De Geer, 1775)
831.		<i>Polygraphus poligraphus</i> (Linnaeus, 1758)
832.		<i>Polygraphus subopacus</i> Thomson, 1871
833.		<i>Rhinoncus castor</i> (Fabricius, 1792)
834.		<i>Rhinoncus pericarpus</i> (Linnaeus, 1758)
835.		<i>Rhynchaenus rusci</i> (Herbst, 1795)
836.		<i>Rhyncolus ater</i> (Linnaeus, 1758)
837.		<i>Rhyncolus elongatus</i> (Gyllenhal, 1827)
838.		+ <i>Rhinusa antirrhini</i> (Paykull, 1800)
839.		<i>Scolytus ratzeburgi</i> Janson, 1856
840.		<i>Sitona lepidus</i> Gyllenhal, 1834
841.		<i>Strophosoma capitatum</i> (De Geer, 1775)
842.		<i>Tachyerges salicis</i> (Linnaeus, 1758)
843.		<i>Tachyerges stigma</i> (Germar, 1821)
844.		<i>Tomicus minor</i> (Hartig, 1834)
845.		<i>Tomicus piniperda</i> (Linnaeus, 1758)
846.		<i>Trypodendron lineatum</i> (Olivier, 1795)
847.		<i>Trypodendron signatum</i> (Fabricius, 1792)
848.		+ <i>Trypophloeus asperatus</i> (Gyllenhal, 1813)
849.		<i>Trypophloeus bispinulus</i> Eggers, 1927
850.		<i>Xylechinus pilosus</i> (Ratzeburg, 1837)
851.		<i>Zacladus geranii</i> (Paykull, 1800)
852.		<i>Rhyacophila dorsalis</i> (Curtis, 1834)

853.		<i>Rhyacophila fasciata</i> Hagen, 1859
854.		<i>Rhyacophila nubila</i> (Zetterstedt, 1840)
855.		<i>Rhyacophila obliterata</i> McLachlan, 1863
856.		<i>Agraylea cognatella</i> McLachlan, 1880
857.		<i>Hydroptila forcipata</i> Eaton, 1873
858.		<i>Hydroptila tineoides</i> Dalman, 1819
859.		<i>Oxyethira distinctella</i> McLachlan, 1880
860.		<i>Philopotamus montanus</i> (Donovan, 1813)
861.		<i>Wormaldia subnigra</i> McLachlan, 1865
862.		<i>Polycentropus aquilonius</i> Martynov, 1926
863.		<i>Polycentropus flavomaculatus</i> (Pictet, 1834)
864.		<i>Agapetus ochripes</i> Curtis, 1834
865.		<i>Hydropsyche instabilis</i> (Curtis, 1834)
866.		<i>Hydropsyche silfvenii</i> Ulmer, 1906
867.		<i>Hydropsyche siltalai</i> Doehler, 1963
868.		<i>Lepidostoma hirtum</i> (Fabricius, 1775)
869.		<i>Ceratopsyche newae</i> (Kolenati, 1858)
870.		<i>Semblis phalaenoides</i> (Linnaeus, 1758)
871.		<i>Beraea pullata</i> (Curtis, 1834)
872.		<i>Sericostoma personatum</i> Spence, 1826
873.		<i>Notidobia ciliaris</i> (Linnaeus, 1761)
874.		<i>Silo pallipes</i> (Fabricius, 1781)
875.		<i>Brachycentrus subnubilus</i> Curtis, 1834
876.		<i>Micrasema setiferum</i> (Pictet, 1834)
877.		<i>Apatania stigmatella</i> (Zetterstedt, 1840)
878.		<i>Limnephilus subnitidus</i> McLachlan, 1875
879.		<i>Asynarchus contumax</i> McLachlan, 1880
880.		<i>Arctopora trimaculata</i> (Zetterstedt, 1840)
881.		<i>Anchinia daphnella</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)
882.		<i>Denisia similella</i> (Hübner, 1796)
883.		<i>Denisia stipella</i> (Linnaeus, 1758)
884.		<i>Borkhausenia luridicomella</i> (Herrich-Schäffer, 1856)

885.		<i>Pleurota bicostella</i> (Clerck, 1759)
886.		<i>Hypatopa binotella</i> (Thunberg, 1794)
887.		<i>Agnoea josephinae</i> (Toll, 1956)
888.		<i>Apotomis lemniscatana</i> (Kennel, 1900)
889.		<i>Apotomis algidana</i> Krogerus, 1945
890.		<i>Synanthedon culiciformis</i> (Linnaeus, 1758)
891.		<i>Metaxmeste schrankiana</i> (Hochenwarth, 1785)
892.		<i>Anania funebris</i> (Ström, 1768)
893.		<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)
894.		<i>Pyrgus andromedae</i> (Wallengren, 1853)
895.		<i>Pyrgus centaureae</i> (Rambur, 1839)
896.		<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758
897.		<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)
898.		<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)
899.		<i>Pieris (Pieris) brassicae</i> (Linnaeus, 1758)
900.		<i>Pieris (Artogeia) napi</i> (Linnaeus, 1758)
901.		<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)
902.		<i>Colias palaeno</i> (Linnaeus, 1761)
903.		<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)
904.		<i>Lycaena helle</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)
905.		<i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1761)
906.		<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)
907.		<i>Plebejus (Plebejus) argus</i> (Linnaeus, 1758)
908.		<i>Plebejus (Plebejus) idas</i> (Linnaeus, 1761)
909.		<i>Aricia artaxerxes</i> (Fabricius, 1793)
910.		<i>Eumedonia eumedon</i> (Esper, 1780)
911.		<i>Agriades optilete</i> (Knoch, 1781)
912.		<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)
913.		<i>Nymphalis antiopa</i> (Linnaeus, 1758)
914.		<i>Nymphalis urticae</i> (Linnaeus, 1758)
915.		<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)
916.		+ <i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)

917.		<i>Melitaea (Melicta) athalia</i> (Rottemburg, 1775)
918.		<i>Clossiana eunomia</i> Esper, 1799
919.		<i>Clossiana euphrosyne</i> (Linnaeus, 1758)
920.		<i>Clossiana freija</i> (Thunberg, 1791)
921.		<i>Clossiana frigga</i> (Thunberg, 1791)
922.		<i>Clossiana selene</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)
923.		<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)
924.		<i>Argynnis aglaja</i> (Linnaeus, 1758)
925.		<i>Lasiommata petropolitana</i> (Fabricius, 1787)
926.		<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)
927.		<i>Coenonympha tullia</i> (Mueller, 1764)
928.		<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)
929.		<i>Erebia disa</i> (Thunberg, 1791)
930.		<i>Erebia embla</i> (Thunberg, 1791)
931.		<i>Erebia (E.) ligea</i> (Linnaeus, 1758)
932.		<i>Falcaria lacertinaria</i> (Linnaeus, 1758)
933.		<i>Drepana falcata</i> (Linnaeus, 1758)
934.		<i>Tethea or</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)
935.		<i>Ochropacha duplaris</i> (Linnaeus, 1761)
936.		<i>Cabera exanthemata</i> (Scopoli, 1763)
937.		<i>Cabera pusaria</i> (Linnaeus, 1758)
938.		<i>Selenia dentaria</i> (Fabricius, 1775)
939.		<i>Selenia tetralunaria</i> (Hufnagel, 1767)
940.		<i>Hylaea fasciaria</i> (Linnaeus, 1758)
941.		<i>Yezognophos vittaria</i> (Thunberg, 1788)
942.		<i>Hypoxystis pluviaria</i> (Fabricius, 1787)
943.		<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)
944.		<i>Alcis jubata</i> (Thunberg, 1788)
945.		<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)
946.		<i>Macaria liturata</i> (Clerck, 1759)
947.		<i>Macaria brunneata</i> (Thunberg, 1784)
948.		<i>Macaria carbonaria</i> (Clerck, 1759)

949.		<i>Macaria fusca</i> Thnbg.1792
950.		<i>Macaria notata</i> (Linnaeus, 1758)
951.		<i>Chiasmia clathrata</i> (Linnaeus, 1758)
952.		<i>Geometra papilionaria</i> (Linnaeus, 1758)
953.		<i>Lobophora halterata</i> (Hufnagel, 1767)
954.		<i>Spargania luctuata</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)
955.		<i>Xanthorhoe annotinata</i> (Zetterstedt, 1839)
956.		<i>Xanthorhoe decoloraria</i> (Esper, 1806)
957.		<i>Xanthorhoe ferrugata</i> (Clerck, 1759)
958.		<i>Xanthorhoe fluctuata</i> (Linnaeus, 1758)
959.		<i>Xanthorhoe montanata</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)
960.		<i>Xanthorhoe spadicearia</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)
961.		<i>Epirrhoe alternata</i> (Mueller, 1764)
962.		<i>Epirrhoe hastulata</i> (Huebner, 1790)
963.		<i>Pelurga comitata</i> (Linnaeus, 1758)
964.		<i>Entephria caesiata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)
965.		<i>Hydriomena impluviata</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)
966.		<i>Heterothera serraria</i> (Lienig & Zeller, 1846)
967.		<i>Thera variata</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)
968.		<i>Chloroclysta miata</i> (Linnaeus, 1758)
969.		<i>Eulithis prunata</i> (Linnaeus, 1758)
970.		<i>Ecliptopera silaceata</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)
971.		<i>Dysstroma infuscata</i> (Tengstrom, 1869)
972.		<i>Dysstroma truncata</i> (Hufnagel, 1767)
973.		<i>Colostygia turbata</i> (Huebner, 1799)
974.		<i>Lampropteryx suffumata</i> (Denis et Schiffermüller, 1775)
975.		<i>Baptria tibiale</i> (Esper, 1804)
976.		<i>Rheumaptera hastata</i> (Linnaeus, 1758)
977.		<i>Rheumaptera subhastata</i> (Nolcken, 1870)
978.		<i>Epirrita autumnata</i> (Borkhausen, 1794)
979.		<i>Perizoma albulata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)
980.		<i>Perizoma alchemillata</i> (Linnaeus, 1758)

981.		<i>Perizoma blandiata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)
982.		<i>Eupithecia abietaria</i> (Goeze 1781)
983.		<i>Eupithecia absinthiata</i> (Clerck, 1759)
984.		<i>Eupithecia actaeata</i> Walderdorff, 1869
985.		<i>Eupithecia analoga</i> Djakonov, 1926
986.		<i>Eupithecia conterminata</i> (Lienig & Zeller, 1846)
987.		<i>Eupithecia gelidata</i> Möschler, 1860
988.		<i>Eupithecia indigata</i> (Hübner, 1813)
989.		<i>Eupithecia intricata</i> (Zetterstedt, 1839)
990.		<i>Eupithecia plumbeolata</i> (Haworth, 1809)
991.		<i>Eupithecia pusillata</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)
992.		<i>Eupithecia pygmaeata</i> (Hübner, 1799)
993.		<i>Eupithecia satyrata</i> (Hübner, 1813)
994.		<i>Eupithecia virgaureata</i> Doubleday, 1861
995.		<i>Eupithecia vulgata</i> (Haworth, 1809)
996.		<i>Scopula frigidaria</i> (Möschler, 1860)
997.		<i>Scopula (Ustocidalia) ternata</i> Schrank, 1802
998.		<i>Cyclophora (Cyclophora) albipunctata</i> (Hufnagel, 1767)
999.		<i>Trichiura crataegi</i> (Linnaeus, 1758)
1000.		<i>Cosmotriche lobulina</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)
1001.		<i>Hyles gallii</i> (Rottemburg, 1775)
1002.		<i>Furcula bicuspis</i> (Borkhausen, 1790)
1003.		<i>Furcula furcula</i> (Clerck, 1759)
1004.		<i>Notodonta torva</i> (Huebner, 1803)
1005.		<i>Pterostoma palpinum</i> Cl., 1759
1006.		<i>Ptilodon capucina</i> (Linnaeus, 1758)
1007.		<i>Odontosia carmelita</i> (Esper, 1799)
1008.		<i>Clostera pigra</i> (Hufnagel, 1766)
1009.		<i>Manulea lutarellum</i> (Linnaeus, 1758)
1010.		<i>Manulea lurideolum</i> ([Zincken], 1817)
1011.		<i>Thumatha senex</i> (Hübner, 1808)
1012.		<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)

1013.		<i>Parasemia plantaginis</i> (Linnaeus, 1758)
1014.		<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)
1015.		<i>Spilosoma lubricipedum</i> (Linnaeus, 1758)
1016.		<i>Phragmatobia fuliginosa</i> (Linnaeus, 1758)
1017.		<i>Hypenodes humidalis</i> Doubleday, 1850
1018.		<i>Euclidia glyphica</i> (Linnaeus, 1758)
1019.		<i>Callistege mi</i> (Clerck, 1759)
1020.		<i>Nola karelica</i> (Tengström, 1869)
1021.		<i>Diachrysia stenochrysis</i> (Warren, 1913)
1022.		<i>Autographa macrogamma</i> (Eversmann, 1842)
1023.		<i>Syngrapha interrogationis</i> (Linnaeus, 1758)
1024.		<i>Syngrapha microgamma</i> (Hübner, 1823)
1025.		<i>Syngrapha parilis</i> (Hübner, 1809)
1026.		<i>Plusia festucae</i> (Linnaeus, 1758)
1027.		<i>Acronicta auricoma</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)
1028.		<i>Acronicta leporina</i> (Linnaeus, 1758)
1029.		<i>Acronicta megacephala</i> (Denis et Schiffermueller, 1775)
1030.		<i>Acronicta menyanthidis</i> (Esper, 1789)
1031.		<i>Sympistis funebris</i> (Huebner, 1809)
1032.		<i>Sympistis heliophila</i> (Paykull, 1793)
1033.		<i>Caradrina clavipalpis</i> (Scopoli, 1763)
1034.		<i>Apamea crenata</i> (Hufnagel, 1766)
1035.		<i>Apamea furva</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)
1036.		* <i>Apamea kuusamoensis</i> (Aro, 1900)
1037.		<i>Apamea maillardi</i> Geyer, 1834
1038.		<i>Oligia latruncula</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)
1039.		<i>Hyppa rectilinea</i> (Esper, 1788)
1040.		<i>Parastichtis suspecta</i> (Huebner, 1817)
1041.		<i>Mniotype adusta</i> (Esper, 1790)
1042.		<i>Orthosia gothica</i> (Linnaeus, 1758)
1043.		<i>Cerapteryx graminis</i> (Linnaeus, 1758)
1044.		<i>Anarta melanopa</i> (Thunberg, 1791)

1045.		<i>Anarta myrtilli</i> (Linnaeus, 1761)
1046.		<i>Polia lamuta</i> (Herz, 1903)
1047.		<i>Lacanobia suasa</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)
1048.		<i>Lacanobia thalassina</i> (Hufnagel, 1766)
1049.		<i>Ceramica pisi</i> (Linnaeus, 1758)
1050.		<i>Coranarta cordigera</i> (Thunberg, 1788)
1051.		<i>Papestra biren</i> (Goeze, 1781)
1052.		<i>Hada plebeja</i> (Linnaeus, 1761)
1053.		<i>Sideridis rivularis</i> (Fabricius, 1775)
1054.		<i>Hadena bicruris</i> (Hufnagel, 1766)
1055.		<i>Diarsia dahlia</i> (Hübner, 1813)
1056.		<i>Diarsia mendica</i> (Fabricius, 1775)
1057.		<i>Diarsia rubi</i> (Vieweg, 1790)
1058.		<i>Lycophotia porphyria</i> ([Denis & Schiffermüller], 1775)
1059.		<i>Eurois occulta</i> (Linnaeus, 1758)
1060.		<i>Xestia (Anomogyna) alpicola</i> (Zetterstedt, 1839)
1061.		<i>Xestia distensa</i> (Eversmann, 1851)
1062.		<i>Xestia fennica</i> Brandt, 1936
1063.		<i>Xestia gelida</i> (Sparre-Schneider, 1883)
1064.		<i>Xestia laetabilis</i> Zetterstedt, 1839
1065.		<i>Xestia rhaetica</i> (Staudinger, 1871)
1066.		<i>Xestia sincera</i> (Herrich-Schäffer, 1851)
1067.		<i>Xestia speciosa</i> (Hübner, 1813)
1068.		<i>Xestia tecta</i> (Hübner, 1808)
1069.		<i>Protolampra sobrina</i> (Duponchel, 1843)
1070.		<i>Acantholyda posticalis</i> (Matsumura, 1912)
1071.		<i>Cephalcia abietis</i> (Linnaeus, 1758)
1072.		<i>Pamphilius balteatus</i> (Fallén, 1808)
1073.		<i>Pamphilius gyllenhali</i> (Dahlbom, 1835)
1074.		<i>Pamphilius kontuniemii</i> Shinohara, 2003
1075.		<i>Arge ciliaris</i> (Linnaeus, 1767)
1076.		<i>Arge dimidiata</i> (Fallén, 1808)

1077.		<i>Arge ustulata</i> (Linnaeus, 1758)
1078.		<i>Cimbex femoratus</i> (Linnaeus, 1758)
1079.		<i>Abia (Zaraea) fasciata</i> (Linnaeus, 1758)
1080.		<i>Trichiosoma sorbi</i> Hartig, 1840
1081.		<i>Trichiosoma lucorum</i> (Linnaeus, 1758)
1082.		<i>Allantus (Emphytus) basalis</i> (Klug, 1818)
1083.		<i>Allantus (Emphytus) truncatus</i> (Klug, 1818)
1084.		<i>Brachythops flavens</i> (Klug, 1816)
1085.		<i>Claremontia tenuicornis</i> (Klug, 1816)
1086.		<i>Dineura virididorsata</i> (Retzius, 1783)
1087.		<i>Dolerus (Achaetoprion) madidus</i> (Klug, 1818)
1088.		<i>Dolerus (Dicrodolerus) vestigialis</i> (Klug, 1818)
1089.		<i>Dolerus (Dolerus) bimaculatus</i> (Geoffroy, 1785)
1090.		<i>Dolerus (Dolerus) cothurnatus</i> Serville, 1823
1091.		<i>Dolerus (Dolerus) germanicus</i> (Fabricius, 1775)
1092.		<i>Dolerus (Dolerus) yukonensis</i> Norton, 1872
1093.		<i>Dolerus (Equidolerus) gessneri</i> André, 1880
1094.		<i>Dolerus (Equidolerus) pratensis</i> (Linnaeus, 1758)
1095.		<i>Dolerus (Loderus) pratorum</i> (Fallén, 1808)
1096.		<i>Dolerus subarcticus</i> Hellén, 1956
1097.		<i>Dolerus (Poodolerus) aeneus</i> Hartig, 1837
1098.		+ <i>Dolerus (Poodolerus) gonager</i> (Fabricius, 1781)
1099.		<i>Dolerus (Poodolerus) liogaster</i> Thomson, 1871
1100.		<i>Empria immersa</i> (Klug, 1818)
1101.		<i>Empria liturata</i> (Gmelin, 1790)
1102.		<i>Empria tridens</i> (Konow, 1896)
1103.		<i>Euura dentata</i> (Lindqvist, 1937)
1104.		<i>Euura fallax</i> (Serville, 1823)
1105.		<i>Euura histrio</i> (Serville, 1823)
1106.		<i>Euura pallescens</i> (Hartig, 1837)
1107.		<i>Euura pallidior</i> (Hellén, 1970)
1108.		<i>Euura papillosa</i> (Retzius, 1783)

1109.		<i>Euura poecilonota</i> (Zaddach, 1876)
1110.		<i>Euura stenogaster</i> (Förster, 1854)
1111.		<i>Euura viduata</i> (Zetterstedt, 1838)
1112.		<i>Euura villosa</i> (Thomson, 1863)
1113.		<i>Fenusa (Fenusa) dohrnii</i> (Tischbein, 1846)
1114.		<i>Metallus albipes</i> (Cameron, 1875)
1115.		<i>Monsoma pulveratum</i> (Retzius, 1783)
1116.		<i>Nematus pallidinervis</i> (Hellén, 1951)
1117.		<i>Nematus (Lindqvistia) parviserratus</i> (Lindqvist, 1944)
1118.		<i>Nematus septentrionalis</i> (Linnaeus, 1758)
1119.		<i>Pachynematus villosus</i> Thomson, 1863
1120.		<i>Priophorus morio</i> (Lepeletier, 1923)
1121.		<i>Pristiphora cincta</i> Newman, 1837
1122.		<i>Pristiphora melanocarpa</i> (Hartig, 1840)
1123.		<i>Pristiphora pallidiventris</i> (Fallén, 1808)
1124.		<i>Pteronidea flavescens</i> Stephens, 1835
1125.		<i>Pteronidea parviserratus</i> Lindqvist, 1944
1126.		<i>Pteronidea platystigma</i> Lindqvist, 1948
1127.		<i>Rhogogaster punctulata</i> (Klug, 1817)
1128.		<i>Rhogogaster viridis</i> (Linnaeus, 1758)
1129.		<i>Scolioneura betuleti</i> (Klug, 1816)
1130.		<i>Stromboceros delicatulus</i> (Fallén, 1808)
1131.		<i>Tenthredo (Olivacedo) olivacea</i> Klug, 1817
1132.		<i>Tenthredo (Tenthredella) atra</i> Linnaeus, 1758
1133.		<i>Tenthredo (Tenthredella) colon</i> Klug, 1817
1134.		<i>Tenthredo (Tenthredella) moniliata</i> Klug, 1817
1135.		<i>Tenthredo (Tenthredella) silensis</i> A.Costa, 1859
1136.		<i>Tenthredo (Tenthredo) arctica</i> (Thomson, 1870)
1137.		<i>Xiphydria camelus</i> (Linnaeus, 1758)
1138.		<i>Urocerus gigas</i> (Linnaeus, 1758)
1139.		<i>Anteon ephippiger</i> (Dalman, 1818)
1140.		<i>Anteon jurineanum</i> Latreille, 1809

1141.		<i>Anteon pubicorne</i> (Dalman, 1818)
1142.		+ <i>Aphelopus melaleucus</i> (Dalman, 1818)
1143.		+ <i>Lonchodryinus ruficornis</i> (Dalman, 1818)
1144.		<i>Chrysis angustula</i> Schenck, 1856
1145.		<i>Chrysis fulgida</i> Linnaeus, 1761
1146.		<i>Chrysis schencki</i> Linsenmaier, 1968
1147.		<i>Chrysura hirsuta</i> (Gerstäcker, 1869)
1148.		<i>Sapyga similis</i> (Fabricius, 1793)
1149.		<i>Priocnemis perturbator</i> (Harris, 1780)
1150.		<i>Arachnospila fumipennis</i> (Zetterstedt, 1838)
1151.		<i>Evagetes alamannicus</i> (Blüthgen, 1944)
1152.		<i>Evagetes sahlbergi</i> (F.Moravitz, 1893)
1153.		<i>Camponotus herculeanus</i> (Linnaeus, 1758)
1154.		<i>Formica aquilonia</i> Yarrow, 1955
1155.		<i>Formica fusca</i> Linnaeus, 1758
1156.		<i>Formica truncorum</i> Fabricius, 1804
1157.		<i>Myrmica ruginodis</i> Nylander, 1846
1158.		<i>Myrmica sulcinodis</i> Nylander, 1846
1159.		<i>Formicoxenus nitidulus</i> (Nylander, 1846)
1160.		<i>Harpagoxenus sublaevis</i> Nylander, 1849
1161.		<i>Leptothorax acervorum</i> (Fabricius, 1793)
1162.		<i>Vespula austriaca</i> (Panzer, 1799)
1163.		<i>Vespula rufa</i> (Linnaeus, 1758)
1164.		<i>Vespula vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)
1165.		+ <i>Dolichovespula media</i> (Retzius, 1783)
1166.		<i>Dolichovespula norwegica</i> (Fabricius, 1781)
1167.		+ <i>Dolichovespula saxonica</i> (Fabricius, 1793)
1168.		<i>Ancistrocerus antilope</i> (Panzer, 1789)
1169.		<i>Ancistrocerus oviventris</i> (Wesmael, 1836)
1170.		<i>Ancistrocerus parietum</i> (Linnaeus, 1758)
1171.		<i>Symmorphus allobrogus</i> (Saussure, 1856)
1172.		<i>Symmorphus angustatus</i> (Zetterstedt, 1838)

1173.		<i>Ammophila sabulosa</i> (Linnaeus, 1758)
1174.		<i>Passaloecus borealis</i> Dahlbom, 1844
1175.		<i>Passaloecus insignis</i> (v.d.Linden, 1829)
1176.		<i>Pemphredon inornata</i> Say, 1824
1177.		<i>Pemphredon lugubris</i> (Fabricius, 1793)
1178.		<i>Pemphredon montana</i> Dahlbom, 1844
1179.		<i>Rhopalum clavipes</i> (Linnaeus, 1758)
1180.		+ <i>Crossocerus heydeni</i> Kohl, 1880
1181.		<i>Crossocerus leucostoma</i> (Linnaeus, 1758)
1182.		+ <i>Crossocerus walkeri</i> (Shuckard, 1837)
1183.		<i>Crabro lapponicus</i> Zetterstedt, 1838
1184.		+ <i>Spilomena curruca</i> (Dahlbom, 1843)
1185.		<i>Ectemnius lapidarius</i> Panzer, 1804
1186.		<i>Alysson ratzeburgi</i> Dahlbom, 1843
1187.		<i>Argogorytes mystaceus</i> (Linnaeus, 1761)
1188.		<i>Gorytes neglectus</i> Handlirsch, 1895
1189.		<i>Colletes impunctatus</i> Nylander, 1852
1190.		<i>Hylaeus (Hylaeus) annulatus</i> (Linnaeus, 1758)
1191.		<i>Halictus rubicundus</i> (Christ, 1791)
1192.		<i>Sphecodes crassus</i> Thomson, 1870
1193.		<i>Andrena (Andrena) clarkella</i> (Kirby, 1802)
1194.		<i>Andrena (Andrena) fucata</i> Smith, 1847
1195.		<i>Andrena (Andrena) lapponica</i> Zetterstedt, 1838
1196.		<i>Andrena (Leucandrena) barbilabris</i> (Kirby, 1802)
1197.		<i>Andrena (Melandrena) cineraria</i> (Linnaeus, 1758)
1198.		<i>Andrena (Melandrena) vaga</i> Panzer, 1799
1199.		<i>Andrena (Micrandrena) subopaca</i> Nylander, 1848
1200.		<i>Andrena (Taeniandrena) intermedia</i> Thomson, 1870
1201.		<i>Andrena (Trachandrena) haemorrhoea</i> (Fabricius, 1781)
1202.		<i>Lasioglossum calceatum</i> (Scopoli, 1763)
1203.		<i>Lasioglossum (Evylaeus) fratellum</i> (Pérez, 1903)
1204.		<i>Lasioglossum (Evylaeus) rufitarse</i> (Zetterstedt, 1838)

1205.		<i>Osmia (Melanosmia) inermis</i> (Zetterstedt, 1838)
1206.		<i>Osmia (Melanosmia) nigriventris</i> (Zetterstedt, 1838)
1207.		<i>Osmia (Melanosmia) parietina</i> Curtis, 1828
1208.		<i>Osmia (Melanosmia) uncinata</i> Gerstäcker, 1869
1209.		<i>Megachile (Megachile) lapponica</i> Thomson, 1872
1210.		<i>Megachile (Xanthosarus) nigriventris</i> Schenck, 1870
1211.		<i>Coelioxys (Coelioxys) quadridentatus</i> (Linnaeus, 1758)
1212.		<i>Coelioxys conica</i> (Linnaeus, 1758)
1213.		<i>Nomada panzeri</i> Lepeletier, 1841
1214.		<i>Nomada alboguttata</i> Herrich-Schäffer, 1839
1215.		<i>Bombus (Alpinobombus) alpinus</i> (Linnaeus, 1758)
1216.		<i>Bombus (Alpinobombus) balteatus</i> Dahlbom, 1832
1217.		<i>Bombus (Bombus) cryptarum</i> (Fabricius, 1775)
1218.		<i>Bombus (Bombus) lucorum</i> (Linnaeus, 1761)
1219.		<i>Bombus (Megabombus) hortorum</i> (Linnaeus, 1761)
1220.		<i>Bombus (Pyrobombus) hypnorum</i> (Linnaeus, 1758)
1221.		<i>Bombus (Pyrobombus) jonellus</i> (Kirby, 1802)
1222.		<i>Bombus (Melanobombus) lapidarius</i> (Linnaeus, 1758)
1223.		<i>Bombus (Pyrobombus) lapponicus</i> (Fabricius, 1793)
1224.		<i>Bombus (Thoracobombus) pascuorum</i> (Scopoli, 1763)
1225.		<i>Bombus (Pyrobombus) pratorum</i> (Linnaeus, 1761)
1226.		<i>Bombus (Subterraneobombus) distinguendus</i> Morawitz, 1869
1227.		<i>Bombus (Kallobombus) soroeensis</i> (Fabricius 1777)
1228.		<i>Bombus (Psithyrus) bohemicus</i> Seidl, 1837
1229.		<i>Bombus (Psithyrus) flavidus</i> Eversmann, 1852
1230.		<i>Bombus (Psithyrus) norvegicus</i> (Sparre-Schneider, 1918)
1231.		<i>Bombus (Psithyrus) rupestris</i> (Fabricius, 1793)
1232.		<i>Bombus (Psithyrus) sylvestris</i> (Lepeletier, 1832)
1233.		<i>Bombus (Pyrobombus) cingulatus</i> Wahlberg, 1854
1234.		<i>Bombus (Bombus) sporadicus</i> Nylander, 1848
1235.		<i>Conostigmus crassicornis</i> (Boheman, 1832)
1236.		+ <i>Conostigmus levifrons</i> Kieffer, 1907

1237.		+ <i>Dendrocerus aphidum</i> (Rondani, 1877)
1238.		+ <i>Dendrocerus applanatus</i> Dessart, 1972
1239.		+? <i>Dendrocerus bifoveatus</i> (Kieffer, 1907)
1240.		+ <i>Dendrocerus rectangularis</i> (Kieffer, 1907)
1241.		*** <i>Platyceraphron muscidarum</i> Kieffer, 1906
1242.		+ <i>Lagynodes pallidus</i> (Boheman, 1832)
1243.		<i>Trimorus brevicollis</i> (Thomson, 1859)
1244.		*+ <i>Codrus nebriae</i> (Watanabe, 1954)
1245.		*+ <i>Codrus niger</i> Panzer, 1805
1246.		<i>Cryptoserphus aculeator</i> (Haliday, 1839)
1247.		+ <i>Cryptoserphus dilatus</i> Townes, 1981
1248.		+ <i>Cryptoserphus medius</i> Townes, 1981
1249.		+ <i>Exallonyx</i> (<i>Eocodrus</i>) <i>brevicornis</i> (Haliday, 1839)
1250.		+ <i>Exallonyx</i> (<i>Exallonyx</i>) <i>microcerus</i> Kieffer, 1908
1251.		<i>Phaenoserphus borealis</i> Hellén, 1941
1252.		+ <i>Phaenoserphus chittii</i> (Morley, 1922)
1253.		+ <i>Phaenoserphus pallipes</i> (Jurine, 1807)
1254.		<i>Phaneroserphus calcar</i> (Haliday, 1839)
1255.		<i>Proctotrupes gravidator</i> (Linnaeus, 1758)
1256.		+ <i>Tretoserphus laricis</i> (Haliday, 1839)
1257.		* <i>Belyta abrupta</i> Thomson, 1858
1258.		** <i>Belyta bicolor</i> Jurine, 1807
1259.		* <i>Belyta elongata</i> Thomson, 1858
1260.		<i>Belyta sanguinolenta</i> Nees, 1834
1261.		+ <i>Belyta depressa</i> Thomson, 1859
1262.		* <i>Belyta validicornis</i> Thomson, 1858
1263.		<i>Lyteba bisulca</i> (Nees, 1834)
1264.		** <i>Lyteba carinifrons</i> (Kieffer, 1909)
1265.		*** <i>Pamis ione</i> Nixon, 1957
1266.		** <i>Pantoclis leviventris</i> (Kieffer, 1907)
1267.		<i>Pantoclis breviceps</i> Hellén, 1964
1268.		<i>Pantoclis longipennis</i> (Thomson, 1859)
1269.		<i>Pantoclis opaca</i> (Thomson, 1859)

1270.		**Synbelyta fuscipennis (Thomson, 1858)
1271.		<i>Aclista alticollis</i> (Thomson, 1858)
1272.		<i>Aclista dubia</i> (Kieffer, 1909)
1273.		<i>Aclista rufipes</i> (Kieffer, 1907)
1274.		** Zygota abdominalis (Nees, 1834)
1275.		** Zygota bensoni Nixon, 1957
1276.		*+Zygota balteata Macek, 1997
1277.		+Zygota breviscula (Thomson, 1859)
1278.		+Zygota claviscapa (Thomson, 1859)
1279.		*+Zygota congener (Zetterstedt, 1840)
1280.		*+Zygota croton Nixon, 1957
1281.		*+Zygota excisor (Zetterstedt, 1840)
1282.		<i>Zygota fossulata</i> (Thomson, 1859)
1283.		+Zygota nigra (Thomson, 1859)
1284.		*+Zygota pubescens (Kieffer, 1909)
1285.		<i>Zygota ruficornis</i> (Curtis, 1831)
1286.		*+Zygota sordida Macek, 1997
1287.		+Zygota spinosipes (Kieffer, 1908)
1288.		<i>Acanosema nervosum</i> (Ôhîmsîn, 1858)
1289.		*Opazon frigidum Macek, 1995
1290.		*+Opazon parvulum (Haliday, 1857)
1291.		<i>Pantolyta flaviventris</i> (Thomson, 1858)
1292.		*Pantolyta flexinervis (Macek, 1998)
1293.		*Pantolyta hadrosoma Macek, 1993
1294.		*Pantolyta marginalis (Kieffer, 1909)
1295.		*Pantolyta micans (Macek, 1998)
1296.		*Pantolyta nitida (Thomson, 1858)
1297.		*+Pantolyta nixon Macek, 1993
1298.		<i>Pantolyta rufiventris</i> (Kieffer, 1909)
1299.		<i>Pantolyta sciarivora</i> (Kieffer, 1907)
1300.		<i>Pantolyta semirufa</i> Kieffer, 1908
1301.		<i>Cinetus piceus</i> Thomson, 1858

1302.		+ <i>Anommatium ashmeadi</i> Mayr, 1904
1303.		* <i>Synacra atrata</i> Macek, 1995
1304.		* <i>Synacra holconota</i> Kieffer, 1910
1305.		<i>Synacra sociabilis</i> (Kieffer, 1904)
1306.		<i>Basalys abrupta</i> (Thomson, 1859)
1307.		<i>Basalys fumipennis</i> Westwood, 1883
1308.		*+ <i>Entomacis platyptera</i> (Haliday, 1857)
1309.		<i>Spilomicrus antennatus</i> (Jurine, 1807)
1310.		<i>Psilus cornutus</i> Panzer, 1801
1311.		<i>Monelata parvula</i> (Nees, 1834)
1312.		* <i>Entomacis graeffei</i> Kieffer, 1909
1313.		* <i>Entomacis platyptera</i> (Haliday, 1857)
1314.		* <i>Spilomicrus flavipes</i> Thomson, 1858
1315.		<i>Trybliographa enneatoma</i> (Thomson, 1861)
1316.		<i>Trybliographa cubitalis</i> (Hartig, 1841)
1317.		<i>Trybliographa melanoptera</i> (Hartig, 1843)
1318.		<i>Phaenoglyphis xanthochroa</i> Förster, 1869
1319.		<i>Aphycoides clavellatus</i> (Dalman, 1820)
1320.		<i>Microterys interpunctus</i> Dalman 1820
1321.		<i>Microterys lunatus</i> (Dalman, 1820)
1322.		+ <i>Asaphes vulgaris</i> Walker, 1834
1323.		<i>Eurytoma arctica</i> Thomson, 1876
1324.		<i>Torymus cyaneus</i> Walker, 1847
1325.		+ <i>Brachygaster minuta</i> (Olivier, 1791)
1326.		<i>Dendrosoter middendorffi</i> (Ratzeburg, 1848)
1327.		<i>Doryctes obliterated</i> (Nees, 1834)
1328.		<i>Rhysipolis mediator</i> (Haliday, 1836)
1329.		+ <i>Aleiodes circumscriptus</i> (Nees, 1834)
1330.		<i>Aleiodes dimidiatus</i> (Spinola, 1808)
1331.		+ <i>Aleiodes gastritor</i> (Thunberg, 1822)
1332.		<i>Aleiodes rufipes</i> (Thomson, 1892)
1333.		<i>Atanycolus denigrator</i> (Linnaeus, 1758)

1334.		<i>Bracon obscurator</i> Nees, 1811
1335.		<i>Cyanopterus rector</i> (Thunberg, 1822)
1336.		<i>Blacus diversicornis</i> (Nees, 1834)
1337.		<i>Blacus humilis</i> (Nees, 1811)
1338.		<i>Blacus macropterus</i> Haeselbarth, 1973
1339.		<i>Blacus maculipes</i> Wesmael, 1835
1340.		<i>Peristenus facialis</i> (Thomson, 1892)
1341.		<i>Myiocephalus boops</i> (Wesmael, 1835)
1342.		<i>Orgilus obscurator</i> (Nees, 1812)
1343.		<i>Agathis rufipalpis</i> Nees, 1812
1344.		<i>Earinus gloriatorius</i> (Panzer, 1809)
1345.		<i>Proterops nigripennis</i> Wesmael, 1835
1346.		<i>Ichneutes reunitor</i> Nees, 1816
1347.		<i>Ascogaster varipes</i> Wesmael, 1835
1348.		<i>Chelonus annulatus</i> (Nees, 1816)
1349.		<i>Microgaster deprimator</i> (Fabricius, 1798)
1350.		<i>Microgaster globata</i> (Linnaeus, 1758)
1351.		<i>Microplitis mandibularis</i> (Thomson, 1895)
1352.		<i>Microplitis tuberculifer</i> (Wesmael, 1837)
1353.		<i>Microgaster hospes</i> Marshall, 1885
1354.		<i>Microgaster luctuosa</i> Haliday, 1834
1355.		<i>Hygroplitis russata</i> (Haliday, 1834)
1356.		<i>Glyptapanteles callidus</i> (Haliday, 1834)
1357.		<i>Protapanteles anchisiades</i> (Nixon, 1973)
1358.		<i>Cotesia zygaenarum</i> (Marshall, 1885)
1359.		<i>Deuterixys carbonaria</i> (Wesmael, 1837)
1360.		<i>Trachionus hians</i> (Nees, 1816)
1361.		<i>Diolcogaster claritibia</i> (Papp, 1959)
1362.		<i>Ephedrus lacertosus</i> (Haliday, 1833)
1363.		<i>Ephedrus</i> (<i>Lysephedrus</i>) <i>validus</i> (Haliday, 1833)
1364.		+ <i>Aphidius</i> (A.) <i>urticae</i> Haliday, 1833
1365.		<i>Aphidius</i> (<i>Euaphidius</i>) <i>cingulatus</i> Ruthe, 1859

1366.		+ <i>Pauesia abietis</i> (Marshall, 1896)
1367.		+ <i>Pauesia goidanichi</i> Starý, 1966
1368.		+ <i>Pauesia similis</i> Starý, 1966
1369.		+ <i>Pauesia</i> sp. aff. <i>maculolachni</i> (Starý, 1980)
1370.		<i>Scambus brevicornis</i> (Gravenhorst, 1829)
1371.		<i>Scambus calobatus</i> (Gravenhorst, 1829)
1372.		<i>Scambus inanis</i> (Schränk, 1802)
1373.		<i>Dolichomitus messor</i> (Gravenhorst, 1829)
1374.		*+ <i>Dolichomitus</i> cf. <i>scutellaris</i> (Thomson, 1877)
1375.		+ <i>Dolichomitus</i> ? <i>terebrans</i> (Ratzeburg, 1844)
1376.		*+ <i>Tromatobia variabilis</i> (Holmgren, 1856)
1377.		+ <i>Acrodactyla degener</i> (Haliday, 1838)
1378.		+ <i>Acrodactyla quadrisculpta</i> (Gravenhorst, 1820)
1379.		<i>Iania pictifrons</i> (Thomson, 1877)
1380.		+ <i>Oxyrrhexis carbonator</i> (Gravenhorst, 1807)
1381.		<i>Polysphincta tuberosa</i> Gravenhorst, 1829
1382.		<i>Polysphincta vexator</i> Fitton, Shaw & Gauld, 1988
1383.		+ <i>Zatypota percontatoria</i> (Müller, 1776)
1384.		+ <i>Apechthis quadridentata</i> (Thomson, 1877)
1385.		<i>Itoplectis alternans</i> (Gravenhorst, 1829)
1386.		+ <i>Itoplectis aterrima</i> Jussila, 1965
1387.		<i>Pimpla arctica</i> Zetterstedt, 1838
1388.		+ <i>Pimpla flavicoxis</i> Thomson, 1877
1389.		+ <i>Pimpla turionellae</i> (Linnaeus, 1758)
1390.		+ <i>Delomerista laevis</i> (Gravenhorst, 1829)
1391.		<i>Perithous scurra</i> (Panzer, 1804)
1392.		+ <i>Neoxorides collaris</i> (Gravenhorst, 1829)
1393.		<i>Neoxorides varipes</i> (Holmgren, 1860)
1394.		+ <i>Rhyssa persuasoria</i> (Linnaeus, 1758)
1395.		<i>Diplazon deletus</i> (Thomson, 1890)
1396.		*+ <i>Diplazon nealpinus</i> Zwakhals, 1979
1397.		**+ <i>Diplazon nordicus</i> Klopstein, 2014

1398.		+ <i>Diplazon scutatorius</i> Teunissen, 1943
1399.		<i>Diplazon tetragonus</i> (Thunberg, 1822)
1400.		<i>Homotropus elegans</i> (Gravenhorst, 1829)
1401.		<i>Homotropus pallipes</i> (Gravenhorst, 1829)
1402.		<i>Homotropus pictus</i> (Gravenhorst, 1829)
1403.		<i>Homotropus signatus</i> (Gravenhorst, 1829)
1404.		<i>Sussaba cognata</i> (Holmgren, 1858)
1405.		+ <i>Sussaba flavipes</i> (Lucas, 1849)
1406.		<i>Sussaba pulchella</i> (Holmgren, 1858)
1407.		*+ <i>Syrphophilus scabriculus</i> (Holmgren, 1858)
1408.		+ <i>Tymmophorus erythrozonus</i> (Förster 1850)
1409.		*+ <i>Woldstedtius biguttatus</i> (Gravenhorst, 1829)
1410.		+ <i>Cylloceria borealis</i> (Roman, 1924)
1411.		+ <i>Cylloceria caligata</i> (Gravenhorst, 1829)
1412.		<i>Cylloceria melancholica</i> (Gravenhorst, 1820)
1413.		+ <i>Allomacrus arcticus</i> (Holmgren, 1881)
1414.		+ <i>Batkomacrus caudatus</i> (Holmgren, 1858)
1415.		+ <i>Batkomacrus karelicus</i> Humala, 2010
1416.		+ <i>Batkomacrus subarcticus</i> Humala, 2010
1417.		+ <i>Batkomacrus sylvicola</i> Humala, 2010
1418.		<i>Neurateles falcatus</i> (Thomson, 1897)
1419.		<i>Orthocentrus asper</i> Gravenhorst, 1829
1420.		+ <i>Orthocentrus longicornis</i> Holmgren, 1857
1421.		+ <i>Orthocentrus marginatus</i> Holmgren, 1857
1422.		+ <i>Orthocentrus monilicornis</i> Holmgren, 1857
1423.		*+ <i>Orthocentrus petiolaris</i> Thomson, 1897
1424.		+ <i>Orthocentrus protervus</i> Holmgren, 1857
1425.		+ <i>Orthocentrus sannio</i> Holmgren, 1858
1426.		<i>Orthocentrus spurius</i> Gravenhorst, 1829
1427.		+ <i>Orthocentrus stigmaticus</i> Holmgren, 1858
1428.		+ <i>Orthocentrus winnertzii</i> Förster, 1850
1429.		+ <i>Orthocentrus</i> sp. nova 1

1430.		+ <i>Orthocentrus</i> sp. nova 2
1431.		+ <i>Picrostigeus</i> ? <i>debilis</i> (Gravenhorst, 1829)
1432.		+ <i>Picrostigeus obscurus</i> Horstmann, 1994
1433.		+ <i>Picrostigeus recticauda</i> (Thomson, 1897)
1434.		*+ <i>Stenomacrus affinitor</i> Aubert, 1981
1435.		+ <i>Stenomacrus celer</i> (Holmgren, 1858)
1436.		+ <i>Stenomacrus cognatus</i> (Holmgren, 1858)
1437.		+ <i>Stenomacrus deletus</i> (Thomson, 1897)
1438.		*+ <i>Stenomacrus femoralis</i> (Holmgren, 1858)
1439.		+ <i>Stenomacrus</i> ? <i>laricis</i> (Haliday, 1838)
1440.		*+ <i>Stenomacrus laticollis</i> (Holmgren, 1858)
1441.		+ <i>Stenomacrus merula</i> (Gravenhorst, 1829)
1442.		*+ <i>Stenomacrus pusillator</i> Aubert, 1981
1443.		+ <i>Stenomacrus</i> ? <i>superus</i> (Thomson, 1897)
1444.		+ <i>Stenomacrus ungula</i> (Thomson, 1898)
1445.		*+ <i>Stenomacrus</i> ? <i>vafer</i> (Holmgren, 1858)
1446.		+ <i>Stenomacrus</i> sp. nova 1
1447.		+ <i>Stenomacrus</i> sp. nova 2
1448.		+ <i>Stenomacrus</i> sp. nova 3
1449.		+ <i>Plectiscus impurator</i> Gravenhorst, 1829
1450.		+ <i>Aperileptus albipalpus</i> (Gravenhorst, 1829)
1451.		+ <i>Aperileptus infuscatus</i> Förster, 1871
1452.		+ <i>Aperileptus obscurus</i> Humala, 2007
1453.		+ <i>Aperileptus vanus</i> Förster, 1871
1454.		+ <i>Gnathochorisis crassula</i> (Thomson, 1888)
1455.		+ <i>Gnathochorisis dentifer</i> (Thomson, 1888)
1456.		+ <i>Eusterinx (Divinatrix) inaequalis</i> Rossem, 1981
1457.		<i>Eusterinx (E.) oligomera</i> Förster, 1871
1458.		+ <i>Eusterinx (Holomeristus) minima</i> (Strobl, 1903)
1459.		+ <i>Eusterinx (Holomeristus) tenuicincta</i> (Förster, 1871)
1460.		+ <i>Eusterinx (Ischyrae) bispinosa</i> (Strobl, 1900)
1461.		+ <i>Eusterinx (Trestis) trifasciata</i> (Ashmead, 1899)

1462.		<i>Helictes borealis</i> (Holmgren, 1855)
1463.		+ <i>Megastylus (M.) flavopictus</i> (Gravenhorst, 1829)
1464.		<i>Megastylus (M.) orbitator</i> Schiødte, 1838
1465.		+ <i>Megastylus (Dicolus) pectoralis</i> (Förster, 1871)
1466.		+ <i>Pantisarthrus lubricus</i> (Förster, 1871)
1467.		+ <i>Pantisarthrus luridus</i> Förster, 1871
1468.		+ <i>Dialipsis exilis</i> Förster, 1871
1469.		<i>Plectiscidea (P.) collaris</i> (Gravenhorst, 1829)
1470.		+ <i>Plectiscidea (P.) posticata</i> (Förster, 1871)
1471.		<i>Plectiscidea (P.) petiolata</i> (Förster, 1871)
1472.		+ <i>Plectiscidea zonata</i> (Gravenhorst, 1829)
1473.		<i>Proclitus attentus</i> Förster, 1871
1474.		<i>Proclitus comes</i> (Haliday, 1838)
1475.		+ <i>Proclitus fulvicornis</i> Förster, 1871
1476.		+ <i>Proclitus fulvipectus</i> Förster, 1871
1477.		<i>Proclitus paganus</i> (Haliday, 1838)
1478.		<i>Symplecis alpicola</i> Förster, 1871
1479.		<i>Symplecis bicingulata</i> (Gravenhorst, 1829)
1480.		+ <i>Symplecis breviscula</i> Roman, 1923
1481.		+ <i>Symplecis leucostoma</i> (Förster, 1871)
1482.		<i>Odontocolon dentipes</i> (Gmelin, 1790)
1483.		+ <i>Odontocolon spinipes</i> (Gravenhorst, 1829)
1484.		+ <i>Odontocolon punctulatum</i> (Thomson, 1877)
1485.		+ <i>Ischnoceros caligatus</i> (Gravenhorst, 1829)
1486.		+ <i>Xorides ater</i> (Gravenhorst, 1829)
1487.		<i>Xorides brachylabis</i> (Kriechbaumer, 1889)
1488.		<i>Ctenopelma boreale</i> Holmgren, 1857
1489.		+ <i>Xenoschesis fulvipes</i> (Gravenhorst, 1829)
1490.		*+ <i>Glyptorhaestus punctatus</i> (Thomson, 1890)
1491.		+ <i>Lethades curvispina</i> (Thomson, 1883)
1492.		<i>Trematopygus nigricornis</i> Holmgren, 1857
1493.		<i>Trematopygus vellicans</i> (Gravenhorst, 1829)

1494.		<i>Rhorus lapponicus</i> (Roman, 1909)
1495.		<i>Sympherta obligator</i> (Thunberg, 1822)
1496.		<i>Opheltes glaucopterus</i> (Linnaeus, 1758)
1497.		<i>Lathrolestes orbitalis</i> (Gravenhorst, 1829)
1498.		<i>Alexeter gracilentus</i> (Holmgren, 1857)
1499.		<i>Alexeter segmentarius</i> (Fabricius, 1787)
1500.		<i>Rhinotorus nasutus</i> (Gravenhorst, 1829)
1501.		<i>Rhinotorus umbrarum</i> (Holmgren, 1857)
1502.		<i>Campodorus immarginatus</i> (Thomson, 1894)
1503.		? <i>Campodorus nubilus</i> (Holmgren, 1857)
1504.		<i>Campodorus patagiatus</i> (Holmgren, 1876)
1505.		<i>Mesoleius armillatorius</i> (Gravenhorst, 1807)
1506.		<i>Mesoleius aulicus</i> (Gravenhorst, 1829)
1507.		<i>Mesoleius axillaris</i> (Stephens, 1835)
1508.		<i>Mesoleius filicornis</i> Holmgren, 1876
1509.		<i>Mesoleius geniculatus</i> Holmgren, 1857
1510.		<i>Mesoleius grossulariae</i> (Ratzeburg, 1852)
1511.		+ <i>Saotis nigriventris</i> (Thomson, 1894)
1512.		<i>Synodites carinatus</i> (Holmgren, 1857)
1513.		<i>Anoncus brevitaris</i> (Thomson, 1894)
1514.		<i>Anoncus linitus</i> (Holmgren, 1857)
1515.		<i>Mesoleptidea stalii</i> (Holmgren, 1858)
1516.		<i>Anisotacrus bipunctatus</i> (Gravenhorst, 1829)
1517.		<i>Hadrodactylus faciator</i> (Thunberg, 1822)
1518.		<i>Hadrodactylus femoralis</i> (Holmgren, 1857)
1519.		<i>Hadrodactylus insignis</i> Kriechbaumer, 1891
1520.		<i>Hadrodactylus paludicola</i> (Holmgren, 1856)
1521.		<i>Hadrodactylus semirufus</i> (Holmgren, 1858)
1522.		<i>Hadrodactylus tiphæ</i> (Geoffroy, 1785)
1523.		<i>Syndipnus lateralis</i> (Gravenhorst, 1829)
1524.		<i>Syndipnus maculiventris</i> Roman, 1909
1525.		<i>Hypamblys albopictus</i> (Gravenhorst, 1829)

1526.		<i>Euryproctus alpinus</i> Holmgren, 1857
1527.		<i>Euryproctus arbustorum</i> Holmgren, 1857
1528.		+ <i>Stilbops limneriaeformis</i> (Schmiedeknecht, 1888)
1529.		+ <i>Glypta caudata</i> Thomson, 1889
1530.		<i>Glypta ceratites</i> Gravenhorst, 1829
1531.		<i>Glypta heterocera</i> Thomson, 1889
1532.		<i>Glypta lapponica</i> Holmgren, 1860
1533.		<i>Glypta mensurator</i> (Fabricius, 1775)
1534.		<i>Glypta parvicaudata</i> Bridgman, 1889
1535.		+ <i>Alloplasta piceator</i> (Thunberg, 1822)
1536.		<i>Lissonota coracina</i> (Gmelin, 1790)
1537.		<i>Lissonota sahlbergi</i> Hellén, 1915
1538.		+ <i>Cryptopimpla anomala</i> (Holmgren, 1860)
1539.		+ <i>Cryptopimpla ?errabunda</i> (Gravenhorst, 1829)
1540.		+ <i>Cryptopimpla helvetica</i> Brauns, 1901
1541.		<i>Exetastes geniculosus</i> Holmgren, 1860
1542.		<i>Exetastes illusor</i> Gravenhorst, 1829
1543.		<i>Eclytus ornatus</i> Holmgren, 1857
1544.		*+ <i>Eclytus gelidus</i> Kasparyan, 1977
1545.		<i>Thymaris collaris</i> (Thomson, 1883)
1546.		+ <i>Thymaris niger</i> (Tashenberg, 1865)
1547.		<i>Thymaris tener</i> (Gravenhorst, 1829)
1548.		<i>Tryphon bidentatus</i> Stephens, 1835
1549.		<i>Tryphon bidentulus</i> Thomson, 1883
1550.		<i>Tryphon brunniventris</i> Gravenhorst, 1829
1551.		*+ <i>Tryphon hinzi</i> Heinrich, 1953
1552.		<i>Tryphon obtusator</i> (Thunberg, 1822)
1553.		<i>Grypocentrus cinctellus</i> Ruthe, 1855
1554.		<i>Polyblastus melanostigmus</i> Holmgren, 1857
1555.		+ <i>Polyblastus pallicoxa</i> Thomson, 1888
1556.		<i>Polyblastus stenocentrus</i> Holmgren, 1857
1557.		<i>Polyblastus subalpinus</i> Holmgren, 1857

1558.		+ <i>Polyblastus tener</i> Habermehl, 1909
1559.		<i>Polyblastus varitarsus</i> (Gravenhorst, 1829)
1560.		+ <i>Polyblastus westringi</i> Holmgren, 1857
1561.		+ <i>Ctenochira gelida</i> Kasparyan, 1973
1562.		<i>Ctenochira gilvipes</i> (Holmgren, 1857)
1563.		+ <i>Ctenochira helveticator</i> Aubert, 1965
1564.		<i>Ctenochira infesta</i> (Holmgren, 1857)
1565.		<i>Ctenochira pectinata</i> (Bauer, 1958) Krogerus, 1938
1566.		<i>Erromenus brunnicans</i> (Gravenhorst, 1829)
1567.		<i>Erromenus plebejus</i> (Woldstedt, 1878)
1568.		+ <i>Erromenus punctulatus</i> Holmgren, 1857
1569.		+ <i>Erromenus nitens</i> Strobl, 1903
1570.		<i>Exyston sponsorius</i> (Fabricius, 1781)
1571.		<i>Cteniscus</i> (C.) <i>glutiniatus</i> (Roman, 1909)
1572.		<i>Cteniscus</i> (C.) <i>devius</i> (Mason, 1955)
1573.		<i>Cteniscus</i> (C.) <i>maculiventris</i> (Ashmead, 1896)
1574.		<i>Cteniscus</i> (C.) <i>nigrifrons</i> (Thomson, 1883)
1575.		<i>Cteniscus</i> (C.) <i>scalaris</i> (Gravenhorst, 1829)
1576.		<i>Exenterus amictorius</i> (Panzer, 1801)
1577.		<i>Exenterus ictericus</i> (Gravenhorst, 1829)
1578.		+ <i>Eridolius basalis</i> (Stephens, 1835)
1579.		<i>Eridolius flavomaculatus</i> (Gravenhorst, 1829)
1580.		+ <i>Astrenis brunneofacies</i> Vikberg, 2000
1581.		<i>Barycnemis bellator</i> (Müller, 1776)
1582.		<i>Barycnemis claviventris</i> (Gravenhorst, 1829)
1583.		<i>Barycnemis filicornis</i> (Thomson, 1889)
1584.		***+ <i>Barycnemis finnora</i> Khalaim, 2018
1585.		<i>Barycnemis harpura</i> (Schrank, 1802)
1586.		<i>Probles</i> (<i>Euporizon</i>) <i>truncorum</i> (Holmgren, 1860)
1587.		<i>Probles</i> (<i>Microdiaparsis</i>) <i>versutus</i> (Holmgren, 1860)
1588.		<i>Tersilochus</i> (<i>Pectinolochus</i>) <i>acutangulus</i> Khalaim, 2007
1589.		<i>Tersilochus</i> (<i>Pectinolochus</i>) cf. <i>luteicornis</i> (Hellén, 1958)

1590.		<i>Tersilochus (Tersilochus) heterocerus</i> (Thomson, 1889)
1591.		<i>Casitaria petiolaris</i> (Gravenhorst, 1829)
1592.		<i>Sinophorus turionum</i> (Ratzeburg, 1844)
1593.		<i>Campoletis femoralis</i> (Gravenhorst, 1829)
1594.		<i>Campoletis rapax</i> (Gravenhorst, 1829)
1595.		<i>Campoplex borealis</i> (Zetterstedt, 1838)
1596.		+ <i>Cymodusa (C.) cruentata</i> (Gravenhorst, 1829)
1597.		<i>Diadegma fenestrata</i> (Holmgren, 1860)
1598.		<i>Diadegma hygrobium</i> (Thomson, 1887)
1599.		<i>Dusona annexa</i> (Förster, 1868)
1600.		<i>Dusona anceps</i> (Holmgren, 1860)
1601.		<i>Dusona angustifrons</i> (Förster, 1868)
1602.		<i>Dusona carpathica</i> (Szépligeti, 1916)
1603.		<i>Dusona blanda</i> (Förster, 1868)
1604.		<i>Dusona notabilis</i> (Förster, 1868)
1605.		<i>Dusona petiolator</i> (Fabricius, 1804)
1606.		<i>Dusona sobolicida</i> (Förster, 1868)
1607.		<i>Dusona stragifex</i> (Förster, 1868)
1608.		<i>Hyposoter brischkei</i> (Bridgman, 1882)
1609.		<i>Hyposoter seniculus</i> (Gravenhorst, 1829)
1610.		+ <i>Leptocampoplex cremastoides</i> (Holmgren, 1860)
1611.		<i>Meloboris gracilis</i> Holmgren, 1859
1612.		<i>Olesicampe annulitarsis</i> (Thomson, 1887)
1613.		<i>Olesicampe clandestina</i> (Holmgren, 1860)
1614.		<i>Olesicampe crassitarsis</i> (Thomson, 1887)
1615.		<i>Olesicampe curtigena</i> (Thomson, 1887)
1616.		<i>Olesicampe geniculella</i> (Thomson, 1887)
1617.		<i>Olesicampe macellator</i> (Thunberg, 1822)
1618.		<i>Olesicampe sordidella</i> (Holmgren, 1860)
1619.		? <i>Olesicampe tarsator</i> (Thomson, 1887)
1620.		<i>Olesicampe vetula</i> (Holmgren, 1860)
1621.		<i>Phobocampe bicingulata</i> (Gravenhorst, 1829)

1622.		+ <i>Rhimphoctona xoridiformis</i> (Holmgren, 1860)
1623.		<i>Tranosemella coxalis</i> (Brischke, 1880)
1624.		<i>Tranosemella praerogator</i> (Linnaeus, 1758)
1625.		+ <i>Astiphromma aggressor</i> (Fabricius, 1804)
1626.		+ <i>Astiphromma anale</i> (Holmgren, 1860)
1627.		*+ <i>Astiphromma flavoventrale</i> Riedel, 2015
1628.		+ <i>Astiphromma leucogrammum</i> (Holmgren, 1860)
1629.		+ <i>Astiphromma scutellatum</i> (Gravenhorst, 1829)
1630.		+ <i>Astiphromma splenium</i> (Curtis, 1833)
1631.		<i>Mesochorus gemellus</i> Holmgren, 1860
1632.		<i>Mesochorus stigmator</i> (Thunberg, 1822)
1633.		<i>Mesochorus vitticollis</i> Holmgren, 1860
1634.		<i>Agrypon flaveolatum</i> (Gravenhorst, 1807)
1635.		<i>Agrypon flexorium</i> (Thunberg, 1822)
1636.		+ <i>Agrypon varitarsum</i> (Wesmael, 1849)
1637.		+ <i>Aphanistes bellicosus</i> (Wesmael, 1849)
1638.		*+ <i>Ophion kevoensis</i> Jussila, 1965
1639.		<i>Triclistus congener</i> (Holmgren, 1858)
1640.		<i>Triclistus lativentris</i> Thomson, 1887
1641.		<i>Triclistus spiracularis</i> Thomson, 1887
1642.		<i>Exochus alpinus</i> (Zetterstedt, 1838)
1643.		+ <i>Exochus cf. prosopius</i> Gravenhorst, 1829
1644.		<i>Adelognathus brevicornis</i> Holmgren, 1857
1645.		<i>Adelognathus dorsalis</i> (Gravenhorst, 1829)
1646.		+ <i>Adelognathus longithorax</i> Kasparyan, 1986
1647.		+ <i>Adelognathus punctulatus</i> Thomson, 1883
1648.		+ <i>Adelognathus tetratinctorius</i> (Thunberg, 1822)
1649.		<i>Aptesis gravipes</i> (Gravenhorst, 1829)
1650.		<i>Aptesis jejunator</i> (Gravenhorst, 1807)
1651.		<i>Aptesis nigrocincta</i> (Gravenhorst, 1815)
1652.		<i>Cubocephalus anatorius</i> (Gravenhorst, 1829)
1653.		<i>Cubocephalus longicauda</i> (Thomson, 1883)

1654.		<i>Cubocephalus septentrionalis</i> (Roman, 1909)
1655.		<i>Cubocephalus sperator</i> (Müller, 1776)
1656.		<i>Oresbius nivalis</i> (Zetterstedt, 1838)
1657.		<i>Oresbius septentrionalis</i> (Thomson, 1883)
1658.		<i>Parmortha parvula</i> (Gravenhorst, 1829)
1659.		<i>Pleolophus basizonus</i> (Gravenhorst, 1829)
1660.		<i>Pleolophus larvatus</i> (Gravenhorst, 1829)
1661.		<i>Pleolophus lapponicus</i> (Thomson, 1883)
1662.		<i>Pleolophus sericans</i> (Gravenhorst, 1829)
1663.		<i>Polytribax arrogans</i> (Gravenhorst, 1829)
1664.		<i>Schenkia graminicola</i> (Gravenhorst, 1829)
1665.		<i>Schenkia opacula</i> (Thomson, 1883)
1666.		<i>Schenkia spinolae</i> (Gravenhorst, 1829)
1667.		+ <i>Sphecophaga vesparum</i> (Curtis, 1828)
1668.		<i>Apsilops aquaticus</i> (Thomson, 1874)
1669.		<i>Echthrus reluctator</i> (Linnaeus, 1758)
1670.		<i>Trychosis legator</i> (Thunberg, 1822)
1671.		<i>Cryptus diana</i> Gravenhorst, 1829
1672.		<i>Cryptus obscuripes</i> Zetterstedt, 1838
1673.		+ <i>Cryptus subquadratus</i> Thomson, 1873
1674.		<i>Ischnus alternator</i> (Gravenhorst, 1829)
1675.		<i>Ischnus migrator</i> (Fabricius, 1775)
1676.		<i>Hemiphanes erratum</i> Humala, 2007
1677.		<i>Agasthenes varitarsus</i> (Gravenhorst, 1829)
1678.		<i>Isadelphus gallicola</i> (Bridgman, 1880)
1679.		<i>Gelis agilis</i> (Fabricius, 1775)
1680.		<i>Gelis cursitans</i> (Fabricius, 1775)
1681.		<i>Gelis exareolatus</i> (Förster, 1850)
1682.		<i>Gelis melanocephalus</i> (Schränk, 1781)
1683.		? <i>Gelis mutillatus</i> (Gmelin, 1790)
1684.		<i>Gelis proximus</i> (Förster, 1850)
1685.		? <i>Gelis vulnerans</i> (Förster, 1850)

1686.		<i>Arotrepes perfusor</i> (Gravenhorst, 1829)
1687.		<i>Endasys brevis</i> (Gravenhorst, 1829)
1688.		<i>Atractodes (Asyncrita) acuminator</i> Roman, 1909
1689.		<i>Atractodes (Asyncrita) ambiguus</i> Ruthe, 1859
1690.		<i>Atractodes (Asyncrita) angustipennis</i> Förster, 1876
1691.		<i>Atractodes (Atractodes) bicolor</i> Gravenhorst, 1829
1692.		<i>Atractodes (Asyncrita) croceicornis</i> Haliday, 1838
1693.		<i>Atractodes (Asyncrita) exitialis</i> Förster, 1876
1694.		<i>Atractodes (Asyncrita) foveolatus</i> Gravenhorst, 1829
1695.		<i>Atractodes (Atractodes) pauxillus</i> Förster, 1876
1696.		<i>Atractodes (Hadratractodes) vicinus</i> Förster, 1876
1697.		<i>Atractodes (Rugatractodes) alpinus</i> Förster, 1876
1698.		<i>Atractodes (Rugatractodes) incrassator</i> Roman, 1926
1699.		<i>Mesoleptus incessor</i> (Haliday, 1838)
1700.		<i>Stilpnus crassicornis</i> Thomson, 1884
1701.		<i>Bathythrix claviger</i> (Taschenberg, 1865)
1702.		+ <i>Bathythrix lamina</i> (Thomson, 1884)
1703.		<i>Phygadeuon acutipennis</i> Thomson, 1884
1704.		<i>Phygadeuon hercynicus</i> Gravenhorst, 1829
1705.		<i>Phygadeuon lapponicus</i> Thomson, 1884
1706.		<i>Phygadeuon subspinosus</i> (Gravenhorst, 1829)
1707.		<i>Phygadeuon subtilis</i> Gravenhorst, 1829
1708.		<i>Phygadeuon trichops</i> Thomson, 1884
1709.		<i>Polyaulon paradoxus</i> (Zetterstedt, 1838)
1710.		<i>Stibeutes gravenhorstii</i> Förster, 1850
1711.		<i>Stibeutes heinemanni</i> Förster, 1850
1712.		<i>Dicaelotus pumilus</i> (Gravenhorst, 1829)
1713.		<i>Diadromus subtilicornis</i> (Gravenhorst, 1829)
1714.		<i>Diadromus ustulatus</i> Holmgren, 1890
1715.		<i>Misetus oculatus</i> Wesmael, 1845
1716.		<i>Tycherus ophtalmicus</i> (Wesmael, 1845)
1717.		<i>Phaeogenes curator</i> (Thunberg, 1822)

1718.		<i>Phaeogenes melanogonos</i> (Gmelin, 1790)
1719.		<i>Dirophanes foveolatus</i> (Perkins, 1953)
1720.		<i>Coelichneumon biannulatus</i> (Gravenhorst, 1820)
1721.		<i>Coelichneumon nobilis</i> (Wesmael, 1857)
1722.		<i>Protichneumon pisorius</i> (Linnaeus, 1758)
1723.		<i>Trogus lapidator</i> (Fabricius, 1787)
1724.		<i>Asthenolabus vitratorius</i> (Gravenhorst, 1829)
1725.		<i>Platylabus heteromallus</i> (Berthouemieu, 1910)
1726.		*+ <i>Platylabus ?ruficoxatus</i> Riedel, 2008
1727.		+ <i>Aoplus altercator</i> (Wesmael, 1855)
1728.		<i>Aoplus castaneus</i> (Gravenhorst, 1820)
1729.		<i>Aoplus ?biannulatorius</i> (Thunberg, 1822)
1730.		<i>Aoplus rubricosus</i> (Holmgren, 1864)
1731.		+ <i>Aoplus ruficeps</i> (Gravenhorst, 1829)
1732.		+ <i>Aoplus ?torpidus</i> (Wesmael, 1857)
1733.		<i>Aoplus personatus</i> (Gravenhorst, 1829)
1734.		<i>Gareila tenebrosa</i> (Wesmael, 1845)
1735.		<i>Eupalamus lamentator</i> (Thunberg, 1822)
1736.		<i>Cratichneumon culex</i> (Müller, 1776)
1737.		<i>Cratichneumon pallitarsis</i> (Thomson, 1887)
1738.		+ <i>Cratichneumon sicarius</i> (Gravenhorst, 1829)
1739.		<i>Cratichneumon viator</i> (Scopoli, 1763)
1740.		<i>Ichneumon confusor</i> Gravenhorst, 1820
1741.		<i>Ichneumon didymus</i> Gravenhorst, 1829
1742.		<i>Ichneumon gracilentus</i> Wesmael, 1845
1743.		<i>Ichneumon insidiosus</i> Wesmael, 1845
1744.		<i>Ichneumon lapponicus</i> Hellén, 1951
1745.		<i>Ichneumon ligatorius</i> Thunberg, 1822
1746.		<i>Ichneumon luteipes</i> Wesmael, 1855
1747.		<i>Patrocloides diasemae</i> (Tischbein, 1877)
1748.		<i>Patrocloides lapponicus</i> (Holmgren, 1871)
1749.		<i>Stenichneumon militarius</i> (Thunberg, 1822)

1750.		<i>Stenichneumon ringii</i> (Holmgren, 1884)
1751.		<i>Stenobarichneumon basiglyptus</i> (Kriechbaumer, 1890)
1752.		<i>Thyrateles haereticus</i> (Wesmael, 1854)
1753.		<i>Ctenophthalmus</i> (<i>Euctenophthalmus</i>) <i>uncinatus</i> (Wagner, 1898)(Бугмырин и др., 2003)
1754.		<i>Palaeopsylla</i> (<i>Palaeopsylla</i>) <i>sorecis</i> (Dale, 1878)
1755.		<i>Corrodopsylla birulai</i> (Ioff, 1928)
1756.		<i>Doratopsylla dasyncema</i> (Rothschild, 1897)
1757.		<i>Rhadinopsylla integella</i> J. et R., 1921
1758.		<i>Amalaraeus penicilliger</i> (Grube, 1851)
1759.		<i>Ceratophyllus</i> (<i>Emmareus</i>) <i>garei</i> Rothschild, 1902
1760.		<i>Megabothris</i> (<i>Gebiella</i>) <i>rectangulatus</i> (Wahlgren, 1903)
1761.		<i>Megabothris</i> (<i>Megabothris</i>) <i>calcarifer</i> (Wagner, 1913)
1762.		<i>Peromyscopsylla bidentata</i> (Kolenati, 1863)
1763.		<i>Trichocera annulata</i> Meigen, 1818
1764.		<i>Trichocera regelationis</i> (Linnaeus, 1758)
1765.		<i>Dicranota bimaculata</i> (Schummel, 1829)
1766.		<i>Dicranota exclusa</i> (Walker, 1848)
1767.		<i>Dicranota guerini</i> Zetterstedt, 1838
1768.		<i>Pedicia rivosa</i> (Linnaeus, 1758)
1769.		<i>Pedicia straminea</i> (Meigen, 1838)
1770.		<i>Tricyphona immaculata</i> (Meigen, 1804)
1771.		<i>Tricyphona livida</i> Madrassy, 1881
1772.		<i>Tricyphona schummeli</i> Edwards, 1921
1773.		<i>Ula mixta</i> Starý, 1983
1774.		<i>Ula sylvatica</i> (Meigen, 1818)
1775.		<i>Cheilotrichia alpina</i> (Strobl, 1895)
1776.		<i>Dicranomyia caledonica</i> Edwards, 1926
1777.		<i>Dicranomyia distendens distendens</i> Lundström, 1912
1778.		<i>Dicranomyia mitis</i> (Meigen, 1830)
1779.		<i>Dicranomyia modesta</i> (Meigen, 1818)
1780.		<i>Dicranomyia ponojensis</i> Lundström, 1912
1781.		<i>Dicranomyia rufiventris</i> (Strobl, 1900)

1782.		<i>Dicranomyia stylifera</i> Lackschewitz, 1928
1783.		<i>Dicranomyia tristis</i> (Schummel, 1829)
1784.		<i>Dicranophragma separatum</i> (Walker, 1848)
1785.		<i>Elephantomyia edwardsi</i> Lackschewitz, 1932
1786.		<i>Erioptera flavata</i> (Westhoff, 1882)
1787.		<i>Euphylidorea phaeostigma</i> (Schummel, 1829)
1788.		<i>Hexatoma fuscipennis</i> (Curtis, 1836)
1789.		<i>Hoplolabis (Parilisia) areolata</i> (Siebke, 1872)
1790.		<i>Idioptera linnei</i> Oosterbroek, 1992
1791.		<i>Idioptera pulchella</i> (Meigen, 1830)
1792.		<i>Metalimnobia bifasciata</i> (Schränk, 1781)
1793.		<i>Metalimnobia quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1760)
1794.		<i>Metalimnobia quadrinotata</i> (Meigen, 1818)
1795.		<i>Metalimnobia zetterstedti</i> (Tjeder, 1968)
1796.		<i>Molophilus appendiculatus</i> (Staeger, 1840)
1797.		<i>Molophilus ater</i> (Meigen, 1804)
1798.		<i>Molophilus flavus</i> Goetghebuer, 1920
1799.		<i>Molophilus griseus</i> (Meigen, 1804)
1800.		<i>Molophilus propinquus</i> (Egger, 1863)
1801.		<i>Neolimonia dumetorum</i> (Meigen, 1804)
1802.		<i>Orimarga attenuata</i> (Walker, 1848)
1803.		<i>Ormosia fascipennis</i> (Zetterstedt, 1838)
1804.		<i>Ormosia ruficauda</i> (Zetterstedt, 1838)
1805.		<i>Phylidorea fulvonervosa</i> (Schummel, 1829)
1806.		<i>Phylidorea longicornis longicornis</i> (Schummel, 1829)
1807.		<i>Phylidorea squalens</i> (Zetterstedt, 1838)
1808.		<i>Phylidorea umbrarum</i> (Krogerus, 1937)
1809.		<i>Pilaria discicollis</i> (Meigen, 1818)
1810.		<i>Rhipidia maculata</i> Meigen, 1818
1811.		<i>Symplecta meigeni</i> (Zetterstedt, 1838)
1812.		<i>Cylindrotoma distinctissima distinctissima</i> (Meigen, 1818)
1813.		<i>Diogma caudata</i> Takahashi, 1960

1814.		<i>Phalacrocer a replicata</i> (Linnaeus, 1758)
1815.		<i>Nephrotoma scurra scurra</i> (Meigen, 1818)
1816.		<i>Phoroctenia vittata</i> (Meigen, 1830)
1817.		<i>Prionocera serricornis</i> (Zetterstedt, 1838)
1818.		<i>Prionocera subserricornis</i> (Zetterstedt, 1851)
1819.		<i>Prionocera turcica</i> (Fabricius, 1787)
1820.		<i>Tipula affinis</i> Schummel, 1833
1821.		<i>Tipula circumdata</i> Siebke, 1863
1822.		<i>Tipula excisa excisa</i> Schummel, 1833
1823.		<i>Tipula grisescens</i> Zetterstedt, 1851
1824.		<i>Tipula limbata</i> Zetterstedt, 1838
1825.		<i>Tipula limitata</i> Schummel, 1833
1826.		<i>Tipula lunata</i> Linnaeus, 1758
1827.		<i>Tipula montana verberneae</i> Mannheims & Theowald, 1959
1828.		<i>Tipula nodicornis</i> Meigen, 1818
1829.		<i>Tipula nubeculosa</i> Meigen, 1804
1830.		<i>Tipula pallidicosta pallidicosta</i> Pierre, 1924
1831.		<i>Tipula pseudohortensis</i> Lackschewitz, 1932
1832.		<i>Tipula pseudovariipennis</i> Czizek, 1912
1833.		<i>Tipula quadrivittata</i> Staeger, 1840
1834.		<i>Tipula salicetorum</i> Siebke, 1870
1835.		<i>Tipula scripta</i> Meigen, 1830
1836.		<i>Tipula sintenisi</i> Lackschewitz, 1933
1837.		<i>Tipula subexcisa</i> Lundström, 1907
1838.		<i>Tipula subnodicornis</i> Zetterstedt, 1838
1839.		<i>Tipula unca</i> Wiedemann, 1817
1840.		<i>Tipula variicornis</i> Schummel, 1833
1841.		<i>Tipula varipennis</i> Meigen, 1818
1842.		<i>Tipula winthemi</i> Lackschewitz, 1932
1843.		<i>Dixa nebulosa</i> Meigen, 1830
1844.		<i>Dixella aestivalis</i> (Meigen, 1818)
1845.		<i>Dixella hyperborea</i> (Bergroth, 1889)

1846.		<i>Mochlonyx velutinus</i> (Ruthe, 1831)
1847.		<i>Aedes cataphylla</i> Dyar, 1916
1848.		<i>Aedes cinereus</i> Meigen, 1818
1849.		<i>Aedes excrucians</i> (Walker, 1956)
1850.		<i>Aedes nearcticus</i> Dyar, 1919
1851.		<i>Aedes nigripes</i> (Zetterstedt, 1838)
1852.		<i>Aedes punctor</i> (Kirby, 1837)
1853.		<i>Culiseta bergrothi</i> (Edwards, 1921)
1854.		<i>Culiseta fumipennis</i> (Stephens, 1825)
1855.		<i>Atrichopogon brunnipes</i> (Meigen, 1804)
1856.		<i>Bezzia nigracula</i> (Zetterstedt, 1838)
1857.		<i>Palpomyia armipes</i> (Meigen, 1838)
1858.		<i>Palpomyia aterrima</i> Goetghebuer, 1921
1859.		<i>Palpomyia distincta</i> (Haliday, 1833)
1860.		<i>Palpomyia serripes</i> (Meigen, 1818)
1861.		<i>Palpomyia spinipes</i> (Panzer, 1806)
1862.		<i>Probezzia seminigra</i> (Panzer, 1798)
1863.		<i>Serromyia femorata</i> (Meigen, 1804)
1864.		<i>Ablabesmyia monilis</i> (Linnaeus, 1758)
1865.		<i>Arctopelopia barbitarsis</i> (Zetterstedt, 1850)
1866.		<i>Bryophaenocladus ictericus</i> (Meigen, 1830)
1867.		<i>Chironomus anthracinus</i> Zetterstedt, 1860
1868.		<i>Chironomus cingulatus</i> Meigen, 1830
1869.		<i>Chironomus luctuosa</i> Storå, 1936
1870.		<i>Chironomus lugubris</i> (Zetterstedt, 1850)
1871.		<i>Chironomus pulsus</i> Walker, 1856
1872.		<i>Chironomus staegeri</i> Lundbeck, 1898
1873.		<i>Chironomus tentans</i> Fabricius, 1805
1874.		<i>Cladopelma krusemani</i> (Goetghebuer, 1935)
1875.		<i>Cladopelma viridula</i> (Linnaeus, 1767)
1876.		<i>Conchapelopia melanops</i> (Meigen, 1818)
1877.		<i>Constempellina brevicosta</i> (Edwards, 1937)

1878.		<i>Cricotopus algarum</i> (Kieffer, 1911)
1879.		<i>Cricotopus bicinctus</i> (Meigen, 1818)
1880.		<i>Cricotopus festivellus</i> (Kieffer, 1906)
1881.		<i>Cricotopus tibialis</i> (Meigen, 1804)
1882.		<i>Cricotopus tricinctus</i> (Meigen, 1818)
1883.		<i>Cryptochironomus defectus</i> (Kieffer, 1913)
1884.		<i>Cryptochironomus supplicans</i> (Meigen, 1830)
1885.		<i>Cryptochironomus tshernovskii</i> (Vertshinn, 1962)
1886.		<i>Demicryptochironomus vulneratus</i> (Zetterstedt, 1838)
1887.		<i>Dicrotendipes nervosus</i> (Staeger, 1839)
1888.		<i>Einfeldia dissidens</i> (Walker, 1856)
1889.		<i>Einfeldia dorsalis</i> (Meigen, 1818)
1890.		<i>Einfeldia mendax</i> (Storå, 1936)
1891.		<i>Einfeldia pagana</i> (Meigen, 1838)
1892.		<i>Endochironomus dispar</i> (Meigen, 1830)
1893.		<i>Endochironomus impar</i> (Walker, 1856)
1894.		<i>Glyptotendipes paripes</i> (Edwards, 1929)
1895.		<i>Heterotanytarsus apicalis</i> (Kieffer, 1921)
1896.		<i>Heterotanytarsus cinereipennis</i> (Lundström, 1910)
1897.		<i>Lasiodiamesa sphagnicola</i> (Kieffer, 1925)
1898.		<i>Limnophyes minimus</i> (Meigen, 1818)
1899.		<i>Mesocricotopus karelica</i> Cernovskij, 1949
1900.		<i>Metriocnemus atratulus</i> (Zetterstedt, 1850)
1901.		<i>Metriocnemus fuscipes</i> (Meigen, 1818)
1902.		<i>Micropsectra fusca</i> (Meigen, 1804)
1903.		<i>Micropsectra radialis</i> Goetghebuer, 1939
1904.		<i>Micropsectra sexannulatus</i> (Goetghebuer, 1921)
1905.		<i>Microtendipes pedellus</i> (De Geer, 1776)
1906.		<i>Orthocladius paluster</i> Kieffer, 1924
1907.		<i>Orthocladius saxicola</i> Kieffer, 1911
1908.		<i>Pagastia orientalis</i> (Cernovskij, 1949)
1909.		<i>Pagastiella orophila</i> (Edwards, 1929)

1910.		<i>Paracladius conversus</i> (Walker, 1856)
1911.		<i>Paratendipes nudisquama</i> (Edwards, 1929)
1912.		<i>Paratrichocladius rufiventris</i> (Meigen, 1830)
1913.		<i>Polypedilum pullum</i> (Zetterstedt, 1838)
1914.		<i>Polypedilum scalaenum</i> (Schränk, 1803)
1915.		<i>Polypedilum uncinatum</i> (Goetghebuer, 1921)
1916.		<i>Procladius culiciformis</i> (Linnaeus, 1767)
1917.		<i>Procladius signatus</i> (Zetterstedt, 1850)
1918.		<i>Prodiamesa olivacea</i> (Meigen, 1818)
1919.		<i>Protanypus morio</i> (Zetterstedt, 1838)
1920.		<i>Psectrocladius fennicus</i> Stora, 1939
1921.		<i>Psectrocladius paludicola</i> Kieffer, 1924
1922.		<i>Psectrocladius psilopterus</i> (Kieffer & Thienemann, 1906)
1923.		<i>Psectrocladius simulans</i> (Johannsen, 1937)
1924.		<i>Pseudochironomus prasinatus</i> (Staeger, 1839)
1925.		<i>Pseudodiamesa nivosa</i> (Goetghebuer, 1928)
1926.		<i>Sergentia coracina</i> (Zetterstedt, 1850)
1927.		<i>Stempellinella edwardsi</i> Spies & Sæther, 2004
1928.		<i>Stictochironomus crassiforceps</i> (Kieffer, 1922)
1929.		<i>Tanypus punctipennis</i> (Linnaeus, 1767)
1930.		<i>Tanytarsus heusdensis</i> Goetghebuer, 1923
1931.		<i>Tanytarsus mendax</i> Kieffer, 1925
1932.		<i>Tanytarsus praecox</i> (Meigen, 1818)
1933.		<i>Trichocladius inaequalis</i> Kieffer, 1926
1934.		<i>Trissopelopia longimana</i> (Staeger, 1839)
1935.		<i>Zalutschia mucronata</i> (Cernovskij, 1949)
1936.		<i>Zalutschia paratatica</i> (Cernovskij, 1949)
1937.		<i>Mycetobia gemella</i> Mamaev, 1968
1938.		<i>Mycetobia pallipes</i> Meigen, 1818
1939.		<i>Sylvicola cinctus</i> (Fabricius, 1787)
1940.		<i>Colobostema infumatum</i> (Haliday, 1833)
1941.		<i>Bibio clavipes</i> Meigen, 1818

1942.		<i>Bibio nigriventris</i> Haliday, 1833
1943.		<i>Bibio rufipes</i> (Zetterstedt, 1838)
1944.		<i>Dilophus femoratus</i> Meigen, 1804
1945.		<i>Pachyneura fasciata</i> Zetterstedt, 1838
1946.		<i>Bolitophila aperta</i> Lundström, 1914
1947.		<i>Bolitophila austriaca</i> (Mayer, 1950)
1948.		<i>Bolitophila bimaculata</i> Zetterstedt, 1938
1949.		<i>Bolitophila cinerea</i> Meigen, 1818
1950.		<i>Bolitophila dubia</i> Siebke, 1861
1951.		<i>Bolitophila fumida</i> Edwards, 1941
1952.		<i>Bolitophila hybrida</i> (Meigen, 1804)
1953.		<i>Bolitophila ingrica</i> Stackelberg, 1969
1954.		<i>Bolitophila modesta</i> Lackschewitz, 1937
1955.		<i>Bolitophila nigrolineata</i> Landrock, 1912
1956.		<i>Bolitophila obscurior</i> Stackelberg, 1969
1957.		<i>Bolitophila saundersi</i> (Curtis, 1836)
1958.		<i>Bolitophila spinigera</i> Edwards, 1925
1959.		<i>Diadocidia spinosula</i> Tollet, 1948
1960.		<i>Diadocidia trispinosa</i> Polevoi, 1996
1961.		<i>Isoneuromyia semirufa</i> (Meigen, 1818)
1962.		<i>Keroplatus testaceus</i> Dalman, 1818
1963.		<i>Macrocera angulata</i> Meigen, 1818
1964.		<i>Macrocera lutea</i> Meigen, 1804
1965.		<i>Macrocera parva</i> Lundström, 1914
1966.		<i>Macrocera pilosa</i> Landrock, 1917
1967.		<i>Macrocera pumilio</i> Loew, 1869
1968.		<i>Macrocera stigmoides</i> Edwards, 1925
1969.		<i>Macrocera zetterstedti</i> Lundström, 1914
1970.		<i>Neoplatyura flava</i> (Macquart, 1826)
1971.		<i>Orfelia nigricornis</i> (Fabricius, 1805)
1972.		<i>Pyratula subcanariae</i> Chandler, 2001
1973.		<i>Acnemia falcata</i> Zaitzev, 1982

1974.		<i>Allocotocera pulchella</i> (Curtis, 1837)
1975.		<i>Allodia adunca</i> Zaitzev, 1992
1976.		<i>Allodia anglofennica</i> Edwards, 1921
1977.		<i>Allodia czernyi</i> (Landrock, 1912)
1978.		<i>Allodia lugens</i> (Wiedemann, 1817)
1979.		<i>Allodia lundstroemi</i> Edwards, 1921
1980.		<i>Allodia ornatcollis</i> (Meigen, 1818)
1981.		<i>Allodia pyxidiiformis</i> Zaitzev, 1983
1982.		<i>Allodia septentrionalis</i> Hackman, 1971
1983.		<i>Allodia truncata</i> Edwards, 1921
1984.		<i>Allodia tuomikoskii</i> Hackman, 1971
1985.		<i>Allodia zaitzevi</i> Kurina, 1997
1986.		<i>Allodiopsis rustica</i> (Edwards, 1941)
1987.		<i>Anaclileia dziedickii</i> (Landrock, 1911)
1988.		<i>Anatella ankeli</i> Plassmann, 1977
1989.		<i>Anatella maritima</i> Ostroverkhova, 1979
1990.		<i>Anatella simpatica</i> Dziedzicki, 1923
1991.		<i>Apolephthisa subincana</i> (Curtis, 1837)
1992.		<i>Azana anomala</i> (Staeger, 1840)
1993.		<i>Boletina atridentata</i> Polevoi & Hedmark, 2004
1994.		<i>Boletina basalis</i> (Meigen, 1818)
1995.		<i>Boletina borealis</i> Zetterstedt, 1852
1996.		<i>Boletina cincticornis</i> (Walker, 1848)
1997.		<i>Boletina cordata</i> Polevoi & Hedmark, 2004
1998.		<i>Boletina cornuta</i> Zaitzev, 1994
1999.		<i>Boletina digitata</i> Lundström, 1914
2000.		<i>Boletina dispecta</i> Dziedzicki, 1885
2001.		<i>Boletina dissipata</i> Plassmann, 1986
2002.		<i>Boletina falcata</i> Polevoi & Hedmark, 2004
2003.		<i>Boletina femoscandica</i> Polevoi & Hedmark, 2004
2004.		<i>Boletina gripha</i> Dziedzicki, 1885
2005.		<i>Boletina griphoides</i> Edwards, 1925

2006.		<i>Boletina lundbecki</i> Lundström, 1912
2007.		<i>Boletina maculata</i> Holmgren, 1870
2008.		<i>Boletina minuta</i> Polevoi, 1995
2009.		<i>Boletina moravica</i> Landrock, 1912
2010.		<i>Boletina nigricans</i> Dziedzicki, 1885
2011.		<i>Boletina nigrofusca</i> Dziedzicki, 1885
2012.		<i>Boletina nitiduloides</i> Zaitzev, 1994
2013.		<i>Boletina onegensis</i> Polevoi, 1994
2014.		<i>Boletina pinusia</i> Maximova, 2001
2015.		<i>Boletina plana</i> (Walker, 1856)
2016.		<i>Boletina populina</i> Polevoi, 1995
2017.		<i>Boletina sciarina</i> Staeger, 1840
2018.		<i>Boletina silvatica</i> Dziedzicki, 1885
2019.		<i>Boletina triangularis</i> Polevoi, 1994
2020.		<i>Boletina trivittata</i> (Meigen, 1818)
2021.		<i>Brachypeza bisignata</i> Winnertz, 1864
2022.		<i>Brevicornu arcticum</i> (Lundström, 1913)
2023.		<i>Brevicornu bipartitum</i> Laštovka & Matile, 1974
2024.		<i>Brevicornu canescens</i> (Zetterstedt, 1852)
2025.		<i>Brevicornu griseolum</i> (Zetterstedt, 1852)
2026.		<i>Brevicornu ruficorne</i> (Meigen, 1838)
2027.		<i>Brevicornu sericoma</i> (Meigen, 1830)
2028.		<i>Coelosia fusca</i> Bezzi, 1892
2029.		<i>Coelosia truncata</i> Lundström, 1909
2030.		<i>Cordyla bomloensis</i> Kjærandsen & Kurina, 2004
2031.		<i>Cordyla brevicornis</i> (Staeger, 1840)
2032.		<i>Cordyla fasciata</i> Meigen, 1830
2033.		<i>Cordyla fusca</i> Meigen, 1804
2034.		<i>Cordyla insons</i> Laštovka & Matile, 1974
2035.		<i>Cordyla murina</i> Winnertz, 1864
2036.		<i>Cordyla nitens</i> Winnertz, 1864
2037.		<i>Cordyla nitidula</i> Edwards, 1925

2038.		<i>Cordyla parvipalpis</i> Edwards, 1925
2039.		<i>Cordyla pusilla</i> Edwards, 1925
2040.		<i>Cordyla semiflava</i> (Staeger, 1840)
2041.		<i>Dynatosoma dihaeta</i> Polevoi, 1995
2042.		<i>Dynatosoma fuscicorne</i> (Meigen, 1818)
2043.		<i>Dynatosoma nigromaculatum</i> Lundström, 1913
2044.		<i>Dynatosoma reciprocum</i> (Walker, 1848)
2045.		<i>Dynatosoma silesiacum</i> Ševčik, 2001
2046.		<i>Dynatosoma thoracicum</i> (Zetterstedt, 1838)
2047.		<i>Dziedzickia marginata</i> (Dziedzicki, 1885)
2048.		<i>Ectrepesthoneura hirta</i> (Winnertz, 1846)
2049.		<i>Ectrepesthoneura ovata</i> Ostroverkhova, 1977
2050.		<i>Ectrepesthoneura pubescens</i> (Zetterstedt, 1860)
2051.		<i>Ectrepesthoneura referta</i> Plassmann, 1976
2052.		<i>Ectrepesthoneura tori</i> Zaitzev & Økland, 1992
2053.		<i>Epicypta aterrima</i> (Zetterstedt, 1852)
2054.		<i>Exechia cincta</i> Winnertz, 1864
2055.		<i>Exechia contaminata</i> Winnertz, 1864
2056.		<i>Exechia dizona</i> Edwards, 1924
2057.		<i>Exechia dorsalis</i> (Staeger, 1840)
2058.		<i>Exechia festiva</i> Winnertz, 1864
2059.		<i>Exechia frigida</i> (Boheman, 1865)
2060.		<i>Exechia fusca</i> (Meigen, 1804)
2061.		<i>Exechia lundstroemi</i> Landrock, 1923
2062.		<i>Exechia nigroscutellata</i> Landrock, 1912
2063.		<i>Exechia papyracea</i> Stackelberg, 1948
2064.		<i>Exechia parva</i> Lundström, 1909
2065.		<i>Exechia parvula</i> (Zetterstedt, 1852)
2066.		<i>Exechia pseudocincta</i> Strobl, 1910
2067.		<i>Exechia repanda</i> Johannsen, 1912
2068.		<i>Exechia separata</i> Lundström, 1912
2069.		<i>Exechia seriata</i> (Meigen, 1830)

2070.		<i>Exechia subfrigida</i> Laštovka & Matile, 1974
2071.		<i>Exechia unifasciata</i> Lackschewitz, 1937
2072.		<i>Exechiopsis aemula</i> Plassmann, 1984
2073.		<i>Exechiopsis davatchii</i> Matile, 1969
2074.		<i>Exechiopsis forcipata</i> (Lackschewitz, 1937)
2075.		<i>Exechiopsis hammi</i> (Edwards, 1925)
2076.		<i>Exechiopsis indecisa</i> (Walker, 1856)
2077.		<i>Exechiopsis pseudindecisa</i> Laštovka & Matile, 1974
2078.		<i>Exechiopsis pseudopulchella</i> (Lundström, 1912)
2079.		<i>Exechiopsis sagittata</i> Laštovka & Matile, 1974
2080.		<i>Exechiopsis subulata</i> (Winnertz, 1864)
2081.		<i>Gnoriste bilineata</i> Zetterstedt, 1852
2082.		<i>Hadroneura palmeni</i> Lundström, 1906
2083.		<i>Katatopygia erythropyga</i> (Holmgren, 1883)
2084.		<i>Katatopygia sahlbergi</i> (Lundström, 1906)
2085.		<i>Leia bimaculata</i> (Meigen, 1804)
2086.		<i>Leia subfasciata</i> (Meigen, 1818)
2087.		<i>Leia winthemi</i> Lehmann, 1822
2088.		<i>Mycetophila abiecta</i> (Laštovka, 1963)
2089.		<i>Mycetophila alea</i> Laffoon, 1965
2090.		<i>Mycetophila attonsa</i> (Laffoon, 1957)
2091.		<i>Mycetophila biusta</i> Meigen, 1818
2092.		<i>Mycetophila bohémica</i> (Laštovka, 1963)
2093.		<i>Mycetophila brevitarsata</i> (Laštovka, 1963)
2094.		<i>Mycetophila caudata</i> Staeger, 1840
2095.		<i>Mycetophila confluens</i> Dziedzicki, 1884
2096.		<i>Mycetophila dentata</i> Lundström, 1913
2097.		<i>Mycetophila finlandica</i> Edwards, 1913
2098.		<i>Mycetophila forcipata</i> Lundström, 1913
2099.		<i>Mycetophila fungorum</i> (De Geer, 1776)
2100.		<i>Mycetophila gibbula</i> Edwards, 1925
2101.		<i>Mycetophila haruspica</i> Plassmann, 1990

2102.		<i>Mycetophila hetschkoi</i> Landrock, 1918
2103.		<i>Mycetophila ichneumonea</i> Say, 1823
2104.		<i>Mycetophila laeta</i> Walker, 1848
2105.		<i>Mycetophila lapponica</i> Lundström, 1906
2106.		<i>Mycetophila lubomirskii</i> Dziedzicki, 1884
2107.		<i>Mycetophila luctuosa</i> Meigen, 1830
2108.		<i>Mycetophila magnicauda</i> Strobl, 1895
2109.		<i>Mycetophila marginata</i> Winnertz, 1864
2110.		<i>Mycetophila morata</i> Zaitzev, 1999
2111.		<i>Mycetophila ocellus</i> Walker, 1848
2112.		<i>Mycetophila perpallida</i> Chandler, 1993
2113.		<i>Mycetophila pumila</i> Winnertz, 1864
2114.		<i>Mycetophila pyrenaica</i> Matile, 1967
2115.		<i>Mycetophila quadra</i> Lundström, 1909
2116.		<i>Mycetophila schnablii</i> (Dziedzicki, 1884)
2117.		<i>Mycetophila signatoides</i> Dziedzicki, 1884
2118.		<i>Mycetophila sordida</i> Van der Wulp, 1874
2119.		? <i>Mycetophila strobli</i> Laštovka, 1972
2120.		<i>Mycetophila stylata</i> (Dziedzicki, 1884)
2121.		<i>Mycetophila subsigillata</i> Zaitzev, 1999
2122.		<i>Mycetophila tomensis</i> (Plotnikova, 1962)
2123.		<i>Mycetophila triangulata</i> Dziedzicki, 1884
2124.		<i>Mycetophila uninotata</i> Zetterstedt, 1852
2125.		<i>Mycetophila vittipes</i> Zetterstedt, 1852
2126.		<i>Mycetophila xanthopyga</i> Winnertz, 1864
2127.		<i>Mycetophila zetterstedtii</i> Lundström, 1906
2128.		<i>Mycomya annulata</i> (Meigen, 1818)
2129.		<i>Mycomya cinerascens</i> (Macquart, 1826)
2130.		<i>Mycomya confusa</i> Väisänen, 1979
2131.		<i>Mycomya disa</i> Väisänen, 1984
2132.		<i>Mycomya festivalis</i> Väisänen, 1984
2133.		<i>Mycomya fimbriata</i> (Meigen, 1818)

2134.		<i>Mycomya griseovittata</i> (Zetterstedt, 1852)
2135.		<i>Mycomya hackmani</i> Väisänen, 1984
2136.		<i>Mycomya humida</i> Garrett, 1924
2137.		<i>Mycomya islandica</i> Väisänen, 1984
2138.		<i>Mycomya maculata</i> (Meigen, 1804)
2139.		<i>Mycomya neohyalinata</i> Väisänen, 1984
2140.		<i>Mycomya nitida</i> (Zetterstedt, 1852)
2141.		<i>Mycomya obliqua</i> (Say, 1824)
2142.		<i>Mycomya ornata</i> (Meigen, 1818)
2143.		<i>Mycomya permixta</i> Väisänen, 1984
2144.		<i>Mycomya pseudoapicalis</i> Landrock, 1925
2145.		<i>Mycomya pulchella</i> (Dziedzicki, 1885)
2146.		<i>Mycomya ruficollis</i> (Zetterstedt, 1852)
2147.		<i>Mycomya shermani</i> Garrett, 1924
2148.		<i>Mycomya trilineata</i> (Zetterstedt, 1838)
2149.		<i>Mycomya trivittata</i> (Zetterstedt, 1838)
2150.		<i>Mycomya tumida</i> (Winnertz, 1864)
2151.		<i>Mycomya vittiventris</i> (Zetterstedt, 1852)
2152.		<i>Neoempheria tuomikoskii</i> Väisänen, 1982
2153.		<i>Neuratelia nemoralis</i> (Meigen, 1818)
2154.		<i>Notolopha cristata</i> (Staeger, 1840)
2155.		<i>Phronia biarcuata</i> (Becker, 1908)
2156.		<i>Phronia bicolor</i> Dziedzicki, 1889
2157.		<i>Phronia braueri</i> Dziedzicki, 1889
2158.		<i>Phronia caliginosa</i> Dziedzicki, 1889
2159.		<i>Phronia cinerascens</i> Winnertz, 1864
2160.		<i>Phronia cordata</i> Lundström, 1914
2161.		<i>Phronia crassitarsus</i> Hackman, 1970
2162.		<i>Phronia dziedickii</i> Lundström, 1906
2163.		<i>Phronia egregia</i> Dziedzicki, 1889
2164.		<i>Phronia exigua</i> (Zetterstedt, 1852)
2165.		<i>Phronia flavipes</i> Winnertz, 1864

2166.		<i>Phronia forcipata</i> Winnertz, 1864
2167.		<i>Phronia forcipula</i> Winnertz, 1864
2168.		<i>Phronia interstincta</i> Dziedzicki, 1889
2169.		<i>Phronia nigricornis</i> (Zetterstedt, 1852)
2170.		<i>Phronia nigripalpis</i> Lundström, 1909
2171.		<i>Phronia notata</i> Dziedzicki, 1889
2172.		<i>Phronia strenua</i> Winnertz, 1864
2173.		<i>Phronia willistoni</i> Dziedzicki, 1889
2174.		<i>Phthinia congenita</i> Plassmann, 1984
2175.		<i>Phthinia mira</i> (Ostroverkhova, 1977)
2176.		<i>Platurocypta punctum</i> (Stannius, 1831)
2177.		<i>Platurocypta testata</i> (Edwards, 1925)
2178.		<i>Polylepta borealis</i> Lundström, 1912
2179.		<i>Rondaniella dimidiata</i> (Meigen, 1804)
2180.		<i>Rymosia affinis</i> Winnertz, 1864
2181.		<i>Rymosia fraudatrix</i> Dziedzicki, 1910
2182.		<i>Sceptonia concolor</i> Winnertz, 1864
2183.		<i>Sceptonia costata</i> (Van der Wulp, 1858)
2184.		? <i>Sceptonia cryptocauda</i> Chandler, 1991
2185.		<i>Sceptonia fumipes</i> Edwards, 1925
2186.		<i>Sceptonia fuscipalpis</i> Edwards, 1925
2187.		<i>Sceptonia nigra</i> (Meigen, 1804)
2188.		<i>Sciophila adamsi</i> Edwards, 1925
2189.		<i>Sciophila fenestella</i> Curtis, 1837
2190.		<i>Sciophila geniculata</i> Zetterstedt, 1838
2191.		<i>Sciophila parahirta</i> Polevoi, Null
2192.		<i>Sciophila paucisetosa</i> Polevoi, 1994
2193.		<i>Sciophila persubtilis</i> Polevoi, 2001
2194.		<i>Sciophila rufa</i> Meigen, 1830
2195.		<i>Sciophila yakutica</i> Blagoderov, 1992
2196.		<i>Stigmatomeria obscura</i> (Winnertz, 1864)
2197.		<i>Synplasta praeformida</i> (Dziedzicki, 1910)

2198.		<i>Synplasta pseudingeniosa</i> Zaitzev, 1993
2199.		<i>Syntemna daisetsusana</i> Okada, 1938
2200.		<i>Syntemna penicilla</i> Hutson, 1979
2201.		<i>Syntemna stylata</i> Hutson, 1979
2202.		<i>Tarnania fenestralis</i> (Meigen, 1818)
2203.		<i>Tarnania tarnanii</i> (Dziedzicki, 1910)
2204.		<i>Trichonta amica</i> Gagné, 1981
2205.		<i>Trichonta atricauda</i> (Zetterstedt, 1852)
2206.		<i>Trichonta brevicauda</i> Lundström, 1906
2207.		<i>Trichonta conjungens</i> Lundström, 1909
2208.		<i>Trichonta flavicauda</i> Lundström, 1914
2209.		<i>Trichonta generosa</i> Gagné, 1981
2210.		<i>Trichonta melanura</i> (Staeger, 1840)
2211.		<i>Trichonta subfusca</i> Lundström, 1909
2212.		<i>Trichonta terminalis</i> (Walker, 1856)
2213.		<i>Trichonta venosa</i> (Staeger, 1840)
2214.		<i>Trichonta vulgaris</i> Loew, 1869
2215.		<i>Zygomyia angusta</i> Plassmann, 1977
2216.		<i>Zygomyia notata</i> (Stannius, 1831)
2217.		<i>Zygomyia pictipennis</i> (Staeger, 1840)
2218.		<i>Zygomyia pseudohumeralis</i> Caspers, 1980
2219.		<i>Zygomyia semifusca</i> (Meigen, 1818)
2220.		<i>Zygomyia zaitzevi</i> Chandler, 1991
2221.		<i>Bradysia iridipennis</i> (Zetterstedt, 1838)
2222.		<i>Leptosciarella trochanterata</i> (Zetterstedt, 1851)
2223.		<i>Anthrax anthrax</i> (Schrank, 1781)
2224.		<i>Choerades gilvus</i> (Linnaeus, 1758)
2225.		<i>Choerades lapponicus</i> (Zetterstedt, 1842)
2226.		<i>Lasiopogon cinctus</i> (Fabricius, 1781)
2227.		<i>Dialineura anilis</i> (Linnaeus, 1761)
2228.		<i>Dichoglana nigripennis</i> (Ruthe, 1831)
2229.		<i>Spiriverpa lunulata</i> (Zetterstedt, 1838)

2230.		<i>Thereva fuscinervis</i> Zetterstedt, 1838
2231.		<i>Ptiolina nigra</i> Staeger, 1842
2232.		<i>Rhagio lineola</i> Fabricius, 1794
2233.		<i>Rhagio scolopaceus</i> (Linnaeus, 1758)
2234.		<i>Symphoromyia crassicornis</i> (Panzer, 1806)
2235.		<i>Beris chalybata</i> (Forster, 1771)
2236.		<i>Beris clavipes</i> (Linnaeus, 1767)
2237.		<i>Beris fuscipes</i> Meigen, 1820
2238.		<i>Beris hauseri</i> Stuke, 2004
2239.		<i>Beris morrisii</i> Dale, 1841
2240.		<i>Beris strobli</i> Dusek & Rozkosný, 1968
2241.		<i>Microchrysa cyaneiventris</i> (Zetterstedt, 1842)
2242.		<i>Nemotelus uliginosus</i> (Linnaeus, 1767)
2243.		<i>Neopachygaster stackelbergi</i> (Krivosheina & Rozkosny, 1990)
2244.		<i>Oxycera dives</i> Loew, 1845
2245.		<i>Sargus iridatus</i> (Scopoli, 1763)
2246.		<i>Sargus rufipes</i> Wahlberg, 1854
2247.		<i>Atherix ibis</i> (Fabricius, 1798)
2248.		<i>Atylotus fulvus</i> (Meigen, 1804)
2249.		<i>Atylotus sublunaticornis</i> (Zetterstedt, 1842)
2250.		<i>Chrysops relictus</i> Meigen, 1820
2251.		<i>Chrysops sepulcralis</i> Fabricius, 1794
2252.		<i>Haematopota pluvialis</i> (Linnaeus, 1758)
2253.		<i>Hybomitra arpadi</i> (Szilády, 1923)
2254.		<i>Hybomitra bimaculata</i> (Macquart, 1826)
2255.		<i>Hybomitra borealis</i> (Fabricius, 1781)
2256.		<i>Hybomitra kaurii</i> Chvála & Lyneborg, 1970
2257.		<i>Hybomitra lundbecki</i> Lyneborg, 1959
2258.		<i>Hybomitra lurida</i> (Fallén, 1817)
2259.		<i>Hybomitra nitidifrons</i> (Szilády, 1914)
2260.		<i>Hybomitra tarandina</i> (Linnaeus, 1758)
2261.		<i>Xylophagus ater</i> Meigen, 1804

2262.		<i>Xylophagus cinctus</i> (De Geer, 1776)
2263.		<i>Xylophagus inermis</i> Krivosheina & Krivosheina, 2000
2264.		<i>Xylophagus junki</i> (Szilády, 1932)
2265.		<i>Microphor holosericeus</i> (Meigen, 1804)
2266.		<i>Heleodromia immaculata</i> Haliday, 1833
2267.		<i>Campsicnemus alpinus</i> (Haliday, 1833)
2268.		<i>Campsicnemus articulatus</i> (Zetterstedt, 1843)
2269.		<i>Campsicnemus compeditus</i> Loew, 1857
2270.		<i>Campsicnemus loripes</i> (Haliday, 1832)
2271.		<i>Campsicnemus marginatus</i> Loew, 1857
2272.		<i>Campsicnemus pumilio</i> (Zetterstedt, 1843)
2273.		<i>Campsicnemus pusillus</i> (Meigen, 1824)
2274.		<i>Campsicnemus scambus</i> (Fallén, 1823)
2275.		<i>Chrysotus neglectus</i> (Wiedemann, 1817)
2276.		<i>Chrysotus obscuripes</i> Zetterstedt, 1838
2277.		<i>Chrysotus pulchellus</i> Kowarz, 1874
2278.		<i>Diaphorus nigricans</i> Meigen, 1824
2279.		<i>Dolichopus acuticornis</i> Wiedemann, 1817
2280.		<i>Dolichopus annulipes</i> Zetterstedt, 1838
2281.		<i>Dolichopus armillatus</i> Wahlberg, 1850
2282.		<i>Dolichopus bonsdorffi</i> Frey, 1915
2283.		<i>Dolichopus brevipennis</i> Meigen, 1824
2284.		<i>Dolichopus costalis</i> Frey, 1915
2285.		<i>Dolichopus discifer</i> Stannius, 1831
2286.		<i>Dolichopus discimanus</i> Wahlberg, 1851
2287.		<i>Dolichopus fraterculus</i> Zetterstedt, 1843
2288.		<i>Dolichopus lepidus</i> Staeger, 1842
2289.		<i>Dolichopus linearis</i> Meigen, 1824
2290.		<i>Dolichopus lineatocornis</i> Zetterstedt, 1843
2291.		<i>Dolichopus longicornis</i> Stannius, 1831
2292.		<i>Dolichopus maculipennis</i> Zetterstedt, 1843
2293.		<i>Dolichopus mannerheimi</i> Zetterstedt, 1838

2294.		<i>Dolichopus nitidus</i> Fallén, 1823
2295.		<i>Dolichopus notatus</i> Staeger, 1842
2296.		<i>Dolichopus parvicaudatus</i> Zetterstedt, 1843
2297.		<i>Dolichopus picipes</i> Meigen, 1824
2298.		<i>Dolichopus planitarsis</i> Fallén, 1823
2299.		<i>Dolichopus plumipes</i> (Scopoli, 1736)
2300.		<i>Dolichopus rupestris</i> Haliday, 1833
2301.		<i>Dolichopus simplex</i> Meigen, 1824
2302.		<i>Dolichopus stenhammari</i> Zetterstedt, 1838
2303.		<i>Dolichopus unguatus</i> (Linnaeus, 1758)
2304.		<i>Dolichopus urbanus</i> Meigen, 1824
2305.		<i>Dolichopus vitripennis</i> Meigen, 1824
2306.		<i>Dolichopus zetterstedti</i> Stenhammar, 1852
2307.		<i>Hercostomus aerosus</i> (Fallén, 1823)
2308.		<i>Hercostomus angustifrons</i> (Staeger, 1842)
2309.		<i>Hercostomus brevicornis</i> (Staeger, 1842)
2310.		<i>Hercostomus celer</i> (Meigen, 1824)
2311.		<i>Hercostomus sahlbergi</i> (Zetterstedt, 1838)
2312.		<i>Hydrophorus albiceps</i> Frey, 1915
2313.		<i>Hydrophorus alpinus</i> Wahlberg, 1844
2314.		<i>Hydrophorus borealis</i> Loew, 1857
2315.		<i>Hydrophorus brunnicosus</i> Loew, 1857
2316.		<i>Hydrophorus geminus</i> Frey, 1915
2317.		<i>Hydrophorus nebulosus</i> Fallén, 1823
2318.		<i>Hydrophorus pectinatus</i> Gerstäcker, 1864
2319.		<i>Hydrophorus rufibarbis</i> Gerstäcker, 1864
2320.		<i>Hydrophorus signifer</i> Coquillett, 1899
2321.		<i>Medetera acanthura</i> Negrobov & Thuneberg, 1970
2322.		<i>Medetera apicalis</i> (Zetterstedt, 1843)
2323.		<i>Medetera betulae</i> Ringdahl, 1949
2324.		<i>Medetera borealis</i> Thuneberg, 1955
2325.		<i>Medetera dichrocera</i> Kowarz, 1877

2326.		<i>Medetera fumida</i> Negrobov, 1967
2327.		<i>Rhaphium consobrinum</i> Zetterstedt, 1843
2328.		<i>Rhaphium crassipes</i> (Meigen, 1824)
2329.		<i>Rhaphium elegantulum</i> (Meigen, 1824)
2330.		<i>Rhaphium lanceolatum</i> Loew, 1850
2331.		<i>Rhaphium longicorne</i> (Fallén, 1823)
2332.		<i>Rhaphium micans</i> (Meigen, 1824)
2333.		<i>Rhaphium monotrichum</i> Loew, 1850
2334.		<i>Rhaphium nasutum</i> (Fallén, 1823)
2335.		<i>Rhaphium nigribarbatum</i> (Becker, 1900)
2336.		<i>Rhaphium umbripenne</i> (Frey, 1915)
2337.		<i>Syntormon tarsatus</i> Fallén, 1823
2338.		<i>Thrypticus bellus</i> Loew, 1869
2339.		<i>Thrypticus divisus</i> (Strobl, 1880)
2340.		<i>Thrypticus pollinosus</i> Verrall, 1912
2341.		<i>Chelifera flavella</i> (Zetterstedt, 1838)
2342.		<i>Chelifera frigellii</i> (Zetterstedt, 1838)
2343.		<i>Chelifera precatoria</i> (Fallén, 1816)
2344.		<i>Chelifera stigmatica</i> (Schiner, 1862)
2345.		<i>Dolichocephala bellstedti</i> Joost, 1985
2346.		<i>Dolichocephala ocellata</i> (Costa, 1854)
2347.		<i>Empis borealis</i> Linnaeus, 1758
2348.		<i>Empis lucida</i> Zetterstedt, 1838
2349.		<i>Empis stercorea</i> Linnaeus, 1761
2350.		<i>Hemerodromia adulatoria</i> Collin, 1927
2351.		<i>Hemerodromia oratoria</i> (Fallén, 1816)
2352.		<i>Hemerodromia raptoria</i> Meigen, 1830
2353.		<i>Hilara abdominalis</i> Zetterstedt, 1838
2354.		<i>Hilara bistriata</i> Zetterstedt, 1842
2355.		<i>Hilara chorica</i> (Fallén, 1816)
2356.		<i>Hilara clavipes</i> (Harris, 1776)
2357.		<i>Hilara griseola</i> Zetterstedt, 1838

2358.		<i>Hilara interstincta</i> (Fallén, 1816)
2359.		<i>Hilara nitidula</i> Zetterstedt, 1838
2360.		<i>Hilara obscuritarsis</i> Zetterstedt, 1859
2361.		<i>Rhamphomyia albidiventris</i> Strobl, 1898
2362.		? <i>Rhamphomyia albonigra</i> Frey, 1950
2363.		<i>Rhamphomyia albosegmentata</i> Zetterstedt, 1838
2364.		<i>Rhamphomyia anomalina</i> Zetterstedt, 1838
2365.		<i>Rhamphomyia anomalipennis</i> Meigen, 1822
2366.		<i>Rhamphomyia curvula</i> Frey, 1913
2367.		<i>Rhamphomyia fuscula</i> Zetterstedt, 1838
2368.		<i>Rhamphomyia griseola</i> Zetterstedt, 1838
2369.		<i>Rhamphomyia hybotina</i> Zetterstedt, 1838
2370.		<i>Rhamphomyia ignobilis</i> Zetterstedt, 1859
2371.		<i>Rhamphomyia lapponica</i> Frey, 1955
2372.		<i>Rhamphomyia lividiventris</i> Zetterstedt, 1838
2373.		? <i>Rhamphomyia modesta</i> Wahlberg, 1844
2374.		<i>Rhamphomyia nigripennis</i> (Fabricius, 1794)
2375.		<i>Rhamphomyia niveipennis</i> Zetterstedt, 1838
2376.		<i>Rhamphomyia obscura</i> Zetterstedt, 1838
2377.		<i>Rhamphomyia obscuripennis</i> Meigen, 1830
2378.		<i>Rhamphomyia plumifera</i> Zetterstedt, 1838
2379.		<i>Rhamphomyia plumipes</i> (Meigen, 1804)
2380.		<i>Rhamphomyia poplitea</i> Wahlberg, 1844
2381.		<i>Rhamphomyia praestans</i> Frey, 1913
2382.		<i>Rhamphomyia pusilla</i> Zetterstedt, 1838
2383.		<i>Rhamphomyia sulcata</i> (Meigen, 1804)
2384.		<i>Rhamphomyia tipularia</i> Fallén, 1816
2385.		<i>Rhamphomyia umbripennis</i> Meigen, 1822
2386.		<i>Rhamphomyia unguiculata</i> Frey, 1913
2387.		<i>Anthalia schoenherri</i> Zetterstedt, 1838
2388.		<i>Bicellaria bisetosa</i> Tuomikoski, 1936
2389.		<i>Bicellaria intermedia</i> Lundbeck, 1910

2390.		<i>Bicellaria nigra</i> (Meigen, 1824)
2391.		<i>Bicellaria pilosa</i> Lundbeck, 1910
2392.		<i>Bicellaria spuria</i> (Fallén, 1816)
2393.		<i>Bicellaria subpilosa</i> Collin, 1926
2394.		<i>Bicellaria sulcata</i> (Zetterstedt, 1842)
2395.		<i>Bicellaria uvens</i> Melander, 1928
2396.		<i>Euthyneura albipennis</i> (Zetterstedt, 1842)
2397.		<i>Euthyneura gyllenhali</i> (Zetterstedt, 1838)
2398.		<i>Euthyneura myricae</i> Haliday, 1851
2399.		<i>Euthyneura myrtilli</i> Macquart, 1836
2400.		<i>Hybos grossipes</i> (Linnaeus, 1767)
2401.		<i>Leptopeza borealis</i> Zetterstedt, 1842
2402.		<i>Leptopeza flavipes</i> (Meigen, 1820)
2403.		<i>Ocydromia glabricula</i> (Fallén, 1816)
2404.		<i>Ocydromia melanopleura</i> Loew, 1840
2405.		<i>Oedalea freyi</i> Chvála, 1983
2406.		<i>Oedalea stigmatella</i> Zetterstedt, 1842
2407.		<i>Platypalpus albocapillatus</i> (Fallén, 1815)
2408.		<i>Platypalpus alter</i> (Collin, 1961)
2409.		<i>Platypalpus annulatus</i> (Fallén, 1815)
2410.		<i>Platypalpus ater</i> (Wahlberg, 1844)
2411.		<i>Platypalpus boreoalpinus</i> Frey, 1943
2412.		<i>Platypalpus ciliaris</i> (Fallén, 1816)
2413.		<i>Platypalpus commutatus</i> (Strobl, 1893)
2414.		<i>Platypalpus confinis</i> (Zetterstedt, 1842)
2415.		<i>Platypalpus ecalceatus</i> (Zetterstedt, 1838)
2416.		<i>Platypalpus laestadianorum</i> (Frey, 1913)
2417.		<i>Platypalpus macula</i> (Zetterstedt, 1842)
2418.		<i>Platypalpus minutus</i> (Meigen, 1804)
2419.		<i>Platypalpus nigricoxa</i> (Mik, 1884)
2420.		<i>Platypalpus nigratarsis</i> (Fallén, 1816)
2421.		<i>Platypalpus nonstriatus</i> (Strobl, 1901)

2422.		<i>Platypalpus pallidiventris</i> (Meigen, 1822)
2423.		<i>Platypalpus pseudorapidus</i> Kovalev, 1971
2424.		<i>Platypalpus sahlbergi</i> (Frey, 1909)
2425.		<i>Platypalpus scandinavicus</i> Chvála, 1972
2426.		<i>Platypalpus stigmatellus</i> (Zetterstedt, 1842)
2427.		<i>Platypalpus unguiculatus</i> (Zetterstedt, 1838)
2428.		<i>Platypalpus zetterstedti</i> Chvála, 1971
2429.		<i>Tachypeza heeri</i> Zetterstedt, 1838
2430.		<i>Tachypeza nubila</i> (Meigen, 1804)
2431.		<i>Tachypeza truncorum</i> (Fallén, 1815)
2432.		<i>Tachypeza winthemi</i> Zetterstedt, 1838
2433.		<i>Trichina bilobata</i> Collin, 1926
2434.		<i>Trichina elongata</i> Haliday, 1833
2435.		<i>Trichinomyia fuscipes</i> (Zetterstedt, 1838)
2436.		<i>Anthepiscopus oedalinus</i> (Zetterstedt, 1838)
2437.		<i>Iteaphila furcata</i> (Zetterstedt, 1842)
2438.		<i>Iteaphila macquarti</i> Zetterstedt, 1838
2439.		<i>Iteaphila nitidula</i> Zetterstedt, 1838
2440.		<i>Lonchoptera bifurcata</i> (Fallén, 1810)
2441.		<i>Lonchoptera fallax</i> de Meijere, 1906
2442.		<i>Lonchoptera lutea</i> Panzer, 1809
2443.		<i>Agathomyia elegantula</i> (Fallén, 1815)
2444.		<i>Agathomyia viduella</i> (Zetterstedt, 1838)
2445.		<i>Callomyia amoena</i> Meigen, 1824
2446.		<i>Callomyia speciosa</i> Meigen, 1824
2447.		<i>Microsania pallipes</i> (Meigen, 1830)
2448.		<i>Microsania pectipennis</i> (Meigen, 1830)
2449.		<i>Polyporivora boletina</i> (Fallén, 1815)
2450.		<i>Megaselia angusta</i> (Wood, 1909)
2451.		<i>Megaselia atrosericea</i> Schmitz, 1927
2452.		<i>Megaselia fumata</i> (Malloch, 1909)
2453.		<i>Megaselia pumila</i> (Meigen, 1830)

2454.		<i>Megaselia robusta</i> Schmitz, 1928
2455.		<i>Megaselia septentrionalis</i> (Schmitz, 1919)
2456.		<i>Cephalops aeneus</i> Fallén, 1810
2457.		<i>Cephalops vittipes</i> (Zetterstedt, 1844)
2458.		<i>Chalarus fimbriatus</i> Coe, 1966
2459.		<i>Chalarus indistinctus</i> Jervis, 1992
2460.		<i>Chalarus spurius</i> (Fallén, 1816)
2461.		<i>Dasydorylas horridus</i> (Becker, 1897)
2462.		<i>Dorylomorpha borealis</i> (Wahlgren, 1910)
2463.		<i>Dorylomorpha haemorrhoidalis</i> (Zetterstedt, 1838)
2464.		<i>Dorylomorpha incognita</i> (Verrall, 1901)
2465.		<i>Dorylomorpha xanthocera</i> (Kowarz, 1887)
2466.		<i>Nephrocerus lapponicus</i> Zetterstedt, 1838
2467.		<i>Pipunculus omissinervis</i> Becker, 1889
2468.		? <i>Pipunculus spinipes</i> Meigen, 1830
2469.		<i>Tomosvaryella cilitarsis</i> (Strobl, 1910)
2470.		<i>Tomosvaryella rossica</i> Kuznetzov, 1993
2471.		<i>Tomosvaryella sylvatica</i> (Meigen, 1824)
2472.		<i>Anasimyia lineata</i> (Fabricius, 1787)
2473.		<i>Baccha elongata</i> (Fabricius, 1775)
2474.		<i>Blera fallax</i> (Linnaeus, 1758)
2475.		<i>Brachyopa dorsata</i> Zetterstedt, 1837
2476.		<i>Brachyopa obscura</i> Thompson & Torp, 1982
2477.		<i>Brachyopa testacea</i> (Fallén, 1817)
2478.		<i>Chalcosyrphus jacobsoni</i> (Stackelberg, 1921)
2479.		<i>Chalcosyrphus nemorum</i> (Fabricius, 1805)
2480.		<i>Chalcosyrphus valgus</i> (Gmelin, 1790)
2481.		<i>Chamaesyrphus scaevoides</i> (Fallén, 1817)
2482.		<i>Cheilosia albitarsis</i> (Meigen, 1822)
2483.		<i>Cheilosia angustigenis</i> (Becker, 1894)
2484.		<i>Cheilosia chrysocoma</i> (Meigen, 1822)
2485.		<i>Cheilosia cynocephala</i> Loew, 1840

2486.		<i>Cheilosia flavissima</i> Becker, 1894
2487.		<i>Cheilosia frontalis</i> Loew, 1857
2488.		<i>Cheilosia gigantea</i> (Zetterstedt, 1838)
2489.		<i>Cheilosia longula</i> (Zetterstedt, 1838)
2490.		<i>Cheilosia morio</i> (Zetterstedt, 1838)
2491.		<i>Cheilosia mutabilis</i> (Fallén, 1817)
2492.		<i>Cheilosia naruska</i> Haarto & Kerppola, 2007
2493.		<i>Cheilosia pagana</i> (Meigen, 1822)
2494.		<i>Cheilosia pubera</i> (Zetterstedt, 1838)
2495.		<i>Cheilosia rufimana</i> (Becker, 1894)
2496.		<i>Cheilosia ruralis</i> (Meigen, 1822)
2497.		<i>Cheilosia scutellata</i> (Fallén, 1817)
2498.		<i>Cheilosia sootryeni</i> Nielsen, 1970
2499.		<i>Cheilosia velutina</i> Loew, 1840
2500.		<i>Cheilosia vernalis</i> (Fallén, 1817)
2501.		<i>Chrysosyrphus nasutus</i> (Zetterstedt, 1838)
2502.		<i>Chrysosyrphus niger</i> (Zetterstedt, 1843)
2503.		<i>Chrysotoxum arcuatum</i> (Linnaeus, 1758)
2504.		<i>Chrysotoxum fasciolatum</i> (De Geer, 1776)
2505.		<i>Cryptopipiza notabila</i> (Violovitsh, 1985)
2506.		<i>Dasysyrphus nigricornis</i> (Verrall, 1873)
2507.		<i>Dasysyrphus pinastri</i> (De Geer, 1776)
2508.		<i>Dasysyrphus postclaviger</i> (Stys & Moucha, 1962)
2509.		<i>Dasysyrphus tricinctus</i> (Fallén, 1817)
2510.		<i>Dasysyrphus venustus</i> (Meigen, 1822)
2511.		<i>Epistrophe ochrostoma</i> (Zetterstedt, 1849)
2512.		<i>Eriozona erratica</i> (Linnaeus, 1758)
2513.		<i>Eristalis abusiva</i> Collin, 1931
2514.		<i>Eristalis anthophorina</i> (Fallén, 1817)
2515.		<i>Eristalis arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)
2516.		<i>Eristalis cryptarum</i> (Fabricius, 1794)
2517.		<i>Eristalis nemorum</i> (Linnaeus, 1758)

2518.		<i>Eristalis obscura</i> Loew, 1866
2519.		<i>Eristalis picea</i> (Fallén, 1817)
2520.		<i>Eristalis rupium</i> (Fabricius, 1805)
2521.		<i>Eupeodes corollae</i> (Fabricius, 1794)
2522.		<i>Eupeodes lapponicus</i> (Zetterstedt, 1838)
2523.		<i>Eupeodes latifasciatus</i> (Macquart, 1829)
2524.		<i>Eupeodes lundbecki</i> (Soot Ryen, 1946)
2525.		<i>Eupeodes luniger</i> (Meigen, 1822)
2526.		<i>Eupeodes nielseni</i> Dusek & Láska, 1976
2527.		<i>Eupeodes nitens</i> (Zetterstedt, 1843)
2528.		<i>Eupeodes punctifer</i> (Frey, 1934)
2529.		<i>Ferdinandea cuprea</i> (Scopoli, 1763)
2530.		<i>Hammerschmidtia ferruginea</i> (Fallén, 1817)
2531.		<i>Helophilus affinis</i> Wahlberg, 1844
2532.		<i>Helophilus pendulus</i> (Linnaeus, 1758)
2533.		<i>Heringia fulvimanus</i> (Zetterstedt, 1843)
2534.		<i>Heringia vitripennis</i> (Meigen, 1822)
2535.		<i>Lejogaster metallina</i> Fabricius, 1781
2536.		<i>Lejota ruficornis</i> (Zetterstedt, 1843)
2537.		<i>Melangyna lasiophthalma</i> (Zetterstedt, 1843)
2538.		<i>Melangyna umbellatarum</i> (Fabricius, 1794)
2539.		<i>Melanostoma dubium</i> (Zetterstedt, 1838)
2540.		<i>Melanostoma mellarium</i> (Meigen, 1822)
2541.		<i>Melanostoma mellinum</i> (Linnaeus, 1758)
2542.		<i>Melanostoma scalare</i> (Fabricius, 1794)
2543.		<i>Meligramma triangulifera</i> (Zetterstedt, 1853)
2544.		<i>Meliscaeva cinctella</i> (Zetterstedt, 1843)
2545.		<i>Microdon analis</i> (Macquart, 1842)
2546.		<i>Myathropa florea</i> (Linnaeus, 1758)
2547.		<i>Neoascia geniculata</i> (Meigen, 1822)
2548.		<i>Neoascia meticulosa</i> (Scopoli, 1763)
2549.		<i>Neoascia podagrica</i> (Fabricius, 1775)

2550.		<i>Neoascia tenur</i> (Harris, 1780)
2551.		<i>Orthonevra geniculata</i> (Meigen, 1830)
2552.		<i>Paragus haemorrhous</i> Meigen, 1822
2553.		<i>Paragus tibialis</i> (Fallén, 1817)
2554.		<i>Parasyrphus annulatus</i> (Zetterstedt, 1838)
2555.		<i>Parasyrphus lineolus</i> (Zetterstedt, 1843)
2556.		<i>Parasyrphus nigratarsis</i> (Zetterstedt, 1843)
2557.		<i>Parasyrphus tarsatus</i> (Zetterstedt, 1838)
2558.		<i>Parasyrphus vittiger</i> (Zetterstedt, 1843)
2559.		<i>Parhelophilus sibirica</i> (Stackelberg, 1924)
2560.		<i>Pipiza quadrimaculata</i> (Panzer, 1804)
2561.		<i>Platycheirus albimanus</i> (Fabricius, 1781)
2562.		<i>Platycheirus clypeatus</i> (Meigen, 1822)
2563.		<i>Platycheirus europaeus</i> Goeldlin, Maibach & Speight, 1990
2564.		<i>Platycheirus granditarsus</i> (Förster, 1771)
2565.		<i>Platycheirus holarcticus</i> Vockeroth, 1990
2566.		<i>Platycheirus manicatus</i> (Meigen, 1822)
2567.		<i>Platycheirus parmatus</i> Rondani, 1857
2568.		<i>Platycheirus podagratus</i> (Zetterstedt, 1838)
2569.		<i>Platycheirus scambus</i> (Staeger, 1843)
2570.		<i>Rhingia borealis</i> Ringdahl, 1928
2571.		<i>Sericomyia lappona</i> (Linnaeus, 1758)
2572.		<i>Sericomyia silentis</i> (Harris, 1776)
2573.		<i>Sphaerophoria interrupta</i> (Fabricius, 1805)
2574.		<i>Sphaerophoria menthastri</i> (Linnaeus, 1758)
2575.		<i>Sphaerophoria philantha</i> (Meigen, 1822)
2576.		<i>Sphaerophoria virgata</i> Goeldlin, 1974
2577.		<i>Sphecomyia vespiformis</i> (Gorski, 1852)
2578.		<i>Sphegina calthae</i> Mutin, 1984
2579.		<i>Sphegina clunipes</i> (Fallén, 1816)
2580.		<i>Sphegina sibirica</i> Stackelberg, 1953
2581.		<i>Syritta pipiens</i> (Linnaeus, 1758)

2582.		<i>Syrphus admirandus</i> Goeldlin, 1996
2583.		<i>Syrphus ribesii</i> (Linnaeus, 1758)
2584.		<i>Syrphus torvus</i> (Osten-Sacken, 1875)
2585.		<i>Syrphus vitripennis</i> Meigen, 1822
2586.		<i>Temnostoma vespiforme</i> (Linnaeus, 1758)
2587.		<i>Volucella bombylans</i> (Linnaeus, 1758)
2588.		<i>Xylota florum</i> (Fabricius, 1805)
2589.		<i>Xylota jakutorum</i> Bagatshanova, 1980
2590.		<i>Xylota segnis</i> (Linnaeus, 1758)
2591.		<i>Xylota suecica</i> (Ringdahl, 1943)
2592.		<i>Xylota tarda</i> Meigen, 1822
2593.		<i>Sicus ferrugineus</i> (Linnaeus, 1761)
2594.		<i>Sicus ogumae</i> (Matsumura, 1916)
2595.		<i>Aphanotrigonum nigripes</i> (Zetterstedt, 1848)
2596.		<i>Aphanotrigonum trilineatum</i> (Meigen, 1830)
2597.		<i>Cetema cereris</i> (Fallén, 1820)
2598.		<i>Chlorops figuratus</i> (Zetterstedt, 1848)
2599.		<i>Chlorops kirigaminensis</i> Kanmiya, 1978
2600.		<i>Chlorops meigenii</i> Loew, 1866
2601.		<i>Chlorops pumilionis</i> (Bjerkander, 1778)
2602.		<i>Chlorops rufinus</i> (Zetterstedt, 1848)
2603.		<i>Chlorops scutellaris</i> (Zetterstedt, 1838)
2604.		<i>Chlorops speciosus</i> Meigen, 1830
2605.		<i>Chlorops troglodytes</i> (Zetterstedt, 1848)
2606.		<i>Elachiptera cornuta</i> (Fallén, 1820)
2607.		<i>Elachiptera diastema</i> Collin, 1946
2608.		<i>Elachiptera tuberculifera</i> (Corti, 1909)
2609.		<i>Eribolus nana</i> (Zetterstedt, 1838)
2610.		<i>Gaurax borealis</i> (Duda, 1933)
2611.		<i>Gaurax dubius</i> (Macquart, 1835)
2612.		<i>Melanum laterale</i> (Haliday, 1833)
2613.		<i>Meromyza pratorum</i> Meigen, 1830

2614.		<i>Microcercis trigonella</i> (Duda, 1933)
2615.		<i>Oscinella frit</i> (Linnaeus, 1758)
2616.		<i>Pseudopachychaeta approximatonevris</i> (Zetterstedt, 1848)
2617.		<i>Pseudopachychaeta ruficeps</i> (Zetterstedt, 1838)
2618.		<i>Rhopalopterus atricillum</i> (Zetterstedt, 1838)
2619.		<i>Siphonella oscinina</i> (Fallén, 1820)
2620.		<i>Thaumatomyia notata</i> (Meigen, 1830)
2621.		<i>Thaumatomyia trifasciata</i> (Zetterstedt, 1848)
2622.		<i>Phyllomyza tetragona</i> Hendel, 1924
2623.		<i>Allotrichoma bezzii</i> Becker, 1896
2624.		<i>Athyroglossa glabra</i> (Meigen, 1830)
2625.		<i>Calocoenia paurosoma</i> (Cederhielm, 1954)
2626.		<i>Coenia curvicauda</i> (Meigen, 1830)
2627.		<i>Hydrellia albilabris</i> (Meigen, 1830)
2628.		<i>Hydrellia argyropleura</i> Frey, Null
2629.		<i>Hydrellia tibialis</i> Cresson, 1917
2630.		<i>Notiphila annulipes</i> Stenhammar, 1844
2631.		<i>Ochthera mantis</i> (De Geer, 1776)
2632.		<i>Parydra mitis</i> (Cresson, 1930)
2633.		<i>Pelina aenescens</i> (Stenhammar, 1844)
2634.		<i>Psilopa marginella</i> Fallén, 1823
2635.		<i>Psilopa nitidifacies</i> (Frey, 1958)
2636.		<i>Scatella paludum</i> (Meigen, 1830)
2637.		<i>Scatella silacea</i> Loew, 1860
2638.		<i>Scatella tenuicosta</i> Collin, 1930
2639.		<i>Scatophila mesogramma</i> (Loew, 1869)
2640.		<i>Scatophila planiceps</i> (Boheman, 1852)
2641.		<i>Drosophila testacea</i> von Roser, 1840
2642.		<i>Drosophila transversa</i> Fallén, 1823
2643.		<i>Hirtodrosophila cameraria</i> (Haliday, 1833)
2644.		<i>Lordiphosa fenestrarum</i> (Fallén, 1823)
2645.		<i>Scaptomyza graminum</i> (Fallén, 1823)

2646.		<i>Scaptomyza pallida</i> (Zetterstedt, 1847)
2647.		<i>Diastata flavicosta</i> Chandler, 1987
2648.		<i>Chamaemyia polystigma</i> (Meigen, 1830)
2649.		<i>Homoneura biumbrata</i> (Loew, 1873)
2650.		<i>Homoneura lamellata</i> (Becker, 1895)
2651.		<i>Lauxania cylindricornis</i> (Fabricius, 1794)
2652.		<i>Meiosimyza laeta</i> (Zetterstedt, 1838)
2653.		<i>Minettia loewi</i> (Schiner, 1864)
2654.		<i>Minettia styriaca</i> (Strobl, 1892)
2655.		<i>Pachycerina seticornis</i> (Fallén, 1820)
2656.		<i>Sapromyza amabilis</i> Frey, 1930
2657.		<i>Sapromyza hyalinata</i> (Meigen, 1826)
2658.		<i>Sapromyza zetterstedti</i> Hendel, 1908
2659.		<i>Neria commutata</i> (Czemy, 1930)
2660.		<i>Neria nigricornis</i> (Zetterstedt, 1838)
2661.		<i>Agromyza lucida</i> Hendel, 1920
2662.		<i>Chromatomyia fuscula</i> (Zetterstedt, 1838)
2663.		<i>Chromatomyia nigra</i> (Meigen, 1830)
2664.		<i>Liriomyza flaveola</i> (Fallén, 1823)
2665.		<i>Melanagromyza submetallescens</i> Spencer, 1966
2666.		<i>Phytomyza eumorpha</i> Frey, 1946
2667.		<i>Phytomyza ranunculi</i> (Schrank, 1803)
2668.		<i>Phytomyza solidaginis</i> Hendel, 1920
2669.		<i>Phytomyza subrostrata</i> Frey, 1946
2670.		<i>Phytomyza trollii</i> Hering, 1930
2671.		<i>Phytomyza wahlgreni</i> Rydén, 1944
2672.		<i>Anthomyza gracilis</i> Fallén, 1823
2673.		<i>Anthomyza pallida</i> (Zetterstedt, 1838)
2674.		<i>Aulacigaster pappi</i> Kassebeer, 2001
2675.		<i>Clusia flava</i> (Meigen, 1830)
2676.		<i>Clusiodes albimanus</i> (Meigen, 1830)
2677.		<i>Clusiodes apicalis</i> (Zetterstedt, 1848)

2678.		<i>Clusiodes geomyzinus</i> (Fallén, 1823)
2679.		<i>Clusiodes pictipes</i> (Zetterstedt, 1855)
2680.		<i>Clusiodes ruficollis</i> (Meigen, 1830)
2681.		<i>Anomalochaeta guttipennis</i> (Zetterstedt, 1838)
2682.		<i>Temnosira ambusta</i> (Meigen, 1826)
2683.		<i>Toxoneura venusta</i> Loew, 1858
2684.		<i>Dryomyza anilis</i> Fallén, 1820
2685.		<i>Dryope decrepita</i> (Zetterstedt, 1838)
2686.		<i>Paradryomyza spinigera</i> Ozerov, 1987
2687.		<i>Pseudoneuroctena senilis</i> (Zetterstedt, 1838)
2688.		<i>Dictya umbrarum</i> (Linnaeus, 1758)
2689.		<i>Ditaeniella grisea</i> (Meigen, 1830)
2690.		<i>Ectinocera borealis</i> Zetterstedt, 1838
2691.		<i>Elgiva sollicita</i> (Harris, 1780)
2692.		<i>Hydromya dorsalis</i> (Fabricius, 1775)
2693.		<i>Ilione lineata</i> (Fallén, 1820)
2694.		<i>Limnia unguicornis</i> (Scopoli, 1763)
2695.		<i>Pherbellia albocostata</i> (Fallén, 1820)
2696.		<i>Pherbellia alpina</i> (Frey, 1930)
2697.		<i>Pherbellia brunnipes</i> (Meigen, 1838)
2698.		<i>Pherbellia dubia</i> (Fallén, 1820)
2699.		<i>Pherbellia griseicollis</i> (Becker, 1900)
2700.		<i>Pherbellia griseola</i> (Fallén, 1820)
2701.		<i>Pherbellia obscura</i> (Ringdahl, 1948)
2702.		<i>Pherbellia obtusa</i> (Fallén, 1820)
2703.		<i>Pherbellia schoenherri</i> (Fallén, 1836)
2704.		<i>Pherbellia ventralis</i> (Fallén, 1820)
2705.		<i>Psacadina zernyi</i> (Mayer, 1953)
2706.		<i>Pteromicra glabricula</i> (Fallén, 1820)
2707.		<i>Renocera pallida</i> (Fallén, 1820)
2708.		<i>Renocera striata</i> (Meigen, 1830)
2709.		<i>Renocera stroblii</i> Hendel, 1900

2710.		<i>Sciomyza dryomyzina</i> Zetterstedt, 1846
2711.		<i>Sepedon spinipes</i> (Scopoli, 1763)
2712.		<i>Tetanocera arrogans</i> Meigen, 1830
2713.		<i>Tetanocera elata</i> (Fabricius, 1781)
2714.		<i>Tetanocera ferruginea</i> Fallén, 1820
2715.		<i>Tetanocera fuscinervis</i> (Zetterstedt, 1838)
2716.		<i>Tetanocera hyalipennis</i> von Roser, 1840
2717.		<i>Tetanocera ornatifrons</i> Frey, 1924
2718.		<i>Tetanocera silvatica</i> Meigen, 1830
2719.		<i>Tetanura pallidiventrtris</i> Fallén, 1820
2720.		<i>Trypetoptera punctulata</i> (Scopoli, 1763)
2721.		<i>Nemopoda nitidula</i> (Fallén, 1820)
2722.		<i>Nemopoda pectinulata</i> Loew, 1873
2723.		<i>Sepsis cynipsea</i> (Linnaeus, 1758)
2724.		<i>Sepsis flavimana</i> Meigen, 1826
2725.		<i>Sepsis luteipes</i> Melander & Spuler, 1917
2726.		<i>Sepsis orthocnemis</i> Frey, 1908
2727.		<i>Sepsis punctum</i> (Fabricius, 1794)
2728.		<i>Themira leachi</i> (Meigen, 1826)
2729.		<i>Themira lucida</i> (Staeger, 1844)
2730.		<i>Themira pusilla</i> (Zetterstedt, 1847)
2731.		<i>Themira putris</i> (Linnaeus, 1758)
2732.		<i>Heleomyza pleuralis</i> (Becker, 1907)
2733.		<i>Morpholeria kerteszi</i> Czemy, 1924
2734.		<i>Morpholeria obscuriventrtris</i> (Zetterstedt, 1847)
2735.		<i>Neoleria perpusilla</i> Frey, Null
2736.		<i>Scoliocentra amplicornis</i> (Czemy, 1924)
2737.		<i>Scoliocentra confusa</i> (Wahlgren, 1918)
2738.		<i>Scoliocentra flavotestacea</i> (Zetterstedt, 1838)
2739.		<i>Suillia apicalis</i> (Loew, 1862)
2740.		<i>Suillia atricornis</i> (Meigen, 1830)
2741.		<i>Suillia bicolor</i> (Zetterstedt, 1838)

2742.		<i>Suillia flavifrons</i> (Zetterstedt, 1838)
2743.		<i>Suillia fuscicornis</i> (Zetterstedt, 1847)
2744.		<i>Suillia humilis</i> (Meigen, 1830)
2745.		<i>Suillia laevifrons</i> (Loew, 1862)
2746.		<i>Suillia mikii</i> (Pokorny, 1886)
2747.		<i>Suillia nemorum</i> (Meigen, 1830)
2748.		<i>Suillia pallida</i> (Fallén, 1820)
2749.		<i>Suillia quadrilineata</i> Czerny, 1924
2750.		<i>Crumomyia gelida</i> (Hackman, 1965)
2751.		<i>Leptocera lutosa</i> (Stenhammar, 1855)
2752.		<i>Minilimosina guestphalica</i> (Duda, 1918)
2753.		<i>Rachispoda segem</i> (Rohacek, 1991)
2754.		<i>Spelobia clunipes</i> (Meigen, 1830)
2755.		<i>Spelobia ibrida</i> Rohacek, 1983
2756.		<i>Chamaepsila atra</i> (Meigen, 1826)
2757.		<i>Chamaepsila humeralis</i> (Zetterstedt, 1847)
2758.		<i>Chamaepsila pectoralis</i> (Meigen, 1826)
2759.		<i>Chyliza annulipes</i> Macquart, 1835
2760.		<i>Chyliza vittata</i> Meigen, 1826
2761.		<i>Psila merdaria</i> Collin, 1944
2762.		<i>Psilosoma lefebvrei</i> (Zetterstedt, 1835)
2763.		<i>Dasiops appendiculatus</i> Morge, 1959
2764.		? <i>Dasiops perpropinquus</i> Morge, 1959
2765.		<i>Lonchaea affinis</i> Malloch, 1920
2766.		<i>Lonchaea britteni</i> Collin, 1953
2767.		<i>Lonchaea corusca</i> Czerny, 1934
2768.		<i>Lonchaea difficilis</i> Hackman, 1956
2769.		<i>Lonchaea zetterstedti</i> Becker, 1902
2770.		<i>Amphipogon flavum</i> (Zetterstedt, 1838)
2771.		<i>Piophila nigriceps</i> Meigen, 1826
2772.		? <i>Prochyliza varipes</i> (Meigen, 1830)
2773.		<i>Herina frondescens</i> (Linnaeus, 1758)

2774.		<i>Campiglossa achyrophori</i> (Loew, 1869)
2775.		<i>Campiglossa difficilis</i> (Hendel, 1927)
2776.		<i>Campiglossa guttella</i> (Rondani, 1870)
2777.		<i>Campiglossa tessellata</i> (Loew, 1844)
2778.		<i>Noeeta pupillata</i> (Fallén, 1814)
2779.		<i>Tephritis conura</i> (Loew, 1844)
2780.		<i>Fannia atra</i> (Stein, 1895)
2781.		<i>Fannia carbonaria</i> (Meigen, 1826)
2782.		<i>Fannia incisurata</i> (Zetterstedt, 1837)
2783.		<i>Fannia manicata</i> (Meigen, 1826)
2784.		<i>Fannia polychaeta</i> (Stein, 1895)
2785.		<i>Fannia postica</i> (Stein, 1895)
2786.		<i>Fannia serena</i> (Fallén, 1825)
2787.		<i>Fannia sociella</i> (Zetterstedt, 1845)
2788.		<i>Fannia spathiophora</i> Malloch, 1918
2789.		<i>Fannia umbrosa</i> (Stein, 1895)
2790.		<i>Coenosia bilineella</i> (Zetterstedt, 1838)
2791.		<i>Coenosia comita</i> (Huckett, 1936)
2792.		<i>Coenosia intermedia</i> (Fallén, 1825)
2793.		<i>Coenosia lineatipes</i> (Zetterstedt, 1845)
2794.		<i>Coenosia mollicula</i> (Fallén, 1825)
2795.		<i>Coenosia octopunctata</i> (Zetterstedt, 1838)
2796.		<i>Coenosia pedella</i> (Fallén, 1825)
2797.		<i>Coenosia perpusilla</i> (Meigen, 1826)
2798.		<i>Coenosia pudorosa</i> Collin, 1953
2799.		<i>Coenosia pulicaria</i> (Zetterstedt, 1845)
2800.		<i>Coenosia pumila</i> (Fallén, 1825)
2801.		<i>Coenosia rufipalpis</i> Meigen, 1826
2802.		<i>Coenosia sallae</i> Tiensuu, 1938
2803.		<i>Coenosia trilineella</i> (Zetterstedt, 1838)
2804.		<i>Drymeia vicana</i> (Harris, 1780)
2805.		<i>Helina allotalla</i> (Meigen, 1830)

2806.		<i>Helina annosa</i> (Zetterstedt, 1838)
2807.		<i>Helina atricolor</i> (Fallén, 1825)
2808.		<i>Helina binotata</i> (Zetterstedt, 1845)
2809.		<i>Helina cinerella</i> (Van der Wulp, 1867)
2810.		<i>Helina evecta</i> (Harris, 1780)
2811.		<i>Helina fratercula</i> (Zetterstedt, 1845)
2812.		<i>Helina laxifrons</i> (Zetterstedt, 1860)
2813.		<i>Helina obscurata</i> (Meigen, 1826)
2814.		<i>Helina pubiseta</i> (Zetterstedt, 1845)
2815.		<i>Helina spinicosta</i> (Zetterstedt, 1845)
2816.		<i>Helina squalens</i> (Zetterstedt, 1838)
2817.		? <i>Helina vicina</i> (Czerny, 1900)
2818.		<i>Hydrotaea armipes</i> (Fallén, 1825)
2819.		<i>Hydrotaea dentipes</i> (Fabricius, 1805)
2820.		<i>Hydrotaea diabolus</i> (Harris, 1780)
2821.		<i>Hydrotaea militaris</i> (Meigen, 1826)
2822.		<i>Hydrotaea pandellei</i> Stein, 1899
2823.		<i>Hydrotaea pellucens</i> Portschinsky, 1879
2824.		<i>Hydrotaea scambus</i> (Zetterstedt, 1838)
2825.		<i>Limnophora nigripes</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)
2826.		<i>Limnophora rotundata</i> (Collin, 1930)
2827.		<i>Limnophora triangula</i> (Fallén, 1825)
2828.		<i>Limnophora uniseta</i> Stein, 1916
2829.		<i>Limnospila albifrons</i> (Zetterstedt, 1849)
2830.		<i>Lispe tentaculata</i> (De Geer, 1776)
2831.		<i>Lispocephala alma</i> (Meigen, 1826)
2832.		<i>Lispocephala erythrocer</i> a (Robineau-Desvoidy, 1830)
2833.		<i>Lispocephala verna</i> (Fabricius, 1794)
2834.		<i>Lophosceles cinereiventris</i> (Zetterstedt, 1845)
2835.		<i>Mesembrina mystacea</i> (Linnaeus, 1758)
2836.		? <i>Morellia podagrica</i> (Loew, 1857)
2837.		<i>Musca domestica</i> Linnaeus, 1758

2838.		<i>Muscina levida</i> (Harris, 1780)
2839.		<i>Mydaea affinis</i> Myade, 1891
2840.		<i>Mydaea anicula</i> (Zetterstedt, 1826)
2841.		<i>Mydaea deserta</i> (Zetterstedt, 1845)
2842.		<i>Mydaea humeralis</i> Robineau-Desvoidy, 1830
2843.		<i>Mydaea nebulosa</i> (Stein, 1893)
2844.		<i>Mydaea orthonevra</i> (Macquart, 1835)
2845.		<i>Mydaea setifemur</i> Ringdahl, 1824
2846.		<i>Phaonia angelicae</i> (Scopoli, 1763)
2847.		<i>Phaonia angulicornis</i> (Zetterstedt, 1838)
2848.		<i>Phaonia consobrina</i> (Zetterstedt, 1838)
2849.		<i>Phaonia errans</i> (Meigen, 1826)
2850.		<i>Phaonia erronea</i> (Schabl, 1887)
2851.		<i>Phaonia hybrida</i> (Schabl, 1888)
2852.		<i>Phaonia incana</i> (Wiedemann, 1817)
2853.		<i>Phaonia lugubris</i> (Meigen, 1826)
2854.		<i>Phaonia magnicornis</i> (Zetterstedt, 1845)
2855.		<i>Phaonia meigeni</i> (Pont, 1986)
2856.		? <i>Phaonia profugax</i> (Pandellé, 1899)
2857.		<i>Phaonia rufiventris</i> (Scopoli, 1763)
2858.		? <i>Phaonia tiefii</i> Schabl, 1888
2859.		<i>Phaonia wahlbergi</i> Ringdahl, 1930
2860.		<i>Polietes nigrolimbatus</i> (Bonsdorff, 1866)
2861.		<i>Pseudocoenosia solitaria</i> (Zetterstedt, 1838)
2862.		<i>Schoenomyza litorella</i> (Fallén, 1823)
2863.		<i>Spilogona aerea</i> (Fallén, 1825)
2864.		<i>Spilogona alpica</i> (Zetterstedt, 1845)
2865.		<i>Spilogona brunneisquama</i> (Zetterstedt, 1845)
2866.		<i>Spilogona carbonella</i> (Zetterstedt, 1845)
2867.		<i>Spilogona contractifrons</i> (Zetterstedt, 1838)
2868.		<i>Spilogona denigrata</i> (Meigen, 1826)
2869.		<i>Spilogona depressiuscula</i> (Zetterstedt, 1838)

2870.		<i>Spilogona krogerusi</i> (Ringdahl, 1941)
2871.		<i>Spilogona litorea</i> (Fallén, 1823)
2872.		<i>Spilogona nigriventris</i> (Zetterstedt, 1845)
2873.		<i>Spilogona novemmaculata</i> (Zetterstedt, 1860)
2874.		<i>Spilogona pacifica</i> (Meigen, 1826)
2875.		<i>Spilogona quinquelineata</i> (Zetterstedt, 1838)
2876.		<i>Spilogona septemnotata</i> (Zetterstedt, 1845)
2877.		<i>Spilogona sororcula</i> (Zetterstedt, 1845)
2878.		<i>Spilogona spectabilis</i> (Tiensuu, 1938)
2879.		<i>Spilogona triangulifera</i> (Zetterstedt, 1838)
2880.		<i>Thricops aculeipes</i> (Zetterstedt, 1838)
2881.		<i>Thricops cunctans</i> (Meigen, 1826)
2882.		<i>Thricops diaphanus</i> (Wiedemann, 1817)
2883.		<i>Thricops genarum</i> (Zetterstedt, 1838)
2884.		<i>Thricops hirtulus</i> (Zetterstedt, 1838)
2885.		<i>Thricops innocuus</i> (Zetterstedt, 1838)
2886.		<i>Thricops lividiventris</i> (Zetterstedt, 1845)
2887.		<i>Thricops longipes</i> (Zetterstedt, 1845)
2888.		<i>Thricops nigritellus</i> (Zetterstedt, 1838)
2889.		<i>Thricops semicinereus</i> (Wiedemann, 1817)
2890.		<i>Thricops separ</i> (Zetterstedt, 1845)
2891.		<i>Thricops sudeticus</i> (Schabl, 1888)
2892.		<i>Adia cinerella</i> (Fallén, 1825)
2893.		<i>Alliopsis billbergi</i> (Zetterstedt, 1838)
2894.		<i>Alliopsis conifrons</i> (Zetterstedt, 1845)
2895.		<i>Alliopsis freyi</i> (Ringdahl, 1932)
2896.		<i>Alliopsis moerens</i> (Zetterstedt, 1838)
2897.		<i>Alliopsis silvestris</i> (Fallén, 1824)
2898.		<i>Anthomyia liturata</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)
2899.		<i>Anthomyia monilis</i> (Meigen, 1826)
2900.		<i>Botanophila apiciseta</i> (Ringdahl, 1933)
2901.		<i>Botanophila betarum</i> (Lintner, 1883)

2902.		<i>Botanophila profuga</i> (Stein, 1916)
2903.		<i>Botanophila salicis</i> (Ringdahl, 1918)
2904.		<i>Botanophila striolata</i> (Fallén, 1824)
2905.		<i>Botanophila trapezina</i> (Zetterstedt, 1845)
2906.		<i>Botanophila varicolor</i> (Meigen, 1826)
2907.		<i>Botanophila verticella</i> (Zetterstedt, 1837)
2908.		<i>Chiastocheta inermella</i> (Zetterstedt, 1838)
2909.		<i>Chirosia crassiseta</i> Stein, 1908
2910.		<i>Delia conversata</i> (Tiensuu, 1936)
2911.		<i>Delia fabricii</i> (Holmgren, 1872)
2912.		<i>Delia florilega</i> (Zetterstedt, 1845)
2913.		<i>Delia frontella</i> (Zetterstedt, 1837)
2914.		<i>Delia hirtitibia</i> (Stein, 1916)
2915.		<i>Delia lineariventris</i> (Zetterstedt, 1845)
2916.		<i>Delia pilifemur</i> Ringdahl, 1933
2917.		<i>Delia platura</i> (Meigen, 1826)
2918.		<i>Delia setigera</i> (Stein, 1820)
2919.		<i>Delia subalpina</i> (Ringdahl, 1926)
2920.		<i>Egle minuta</i> (Meigen, 1826)
2921.		<i>Eustalomyia histrio</i> (Zetterstedt, 1837)
2922.		<i>Eutrichota frigida</i> (Zetterstedt, 1845)
2923.		<i>Eutrichota labradorensis</i> (Malloch, 1920)
2924.		<i>Eutrichota longimana</i> (Pokorny, 1887)
2925.		<i>Eutrichota socculata</i> (Zetterstedt, 1838)
2926.		<i>Hydrophoria lancifer</i> (Harris, 1780)
2927.		<i>Hydrophoria linogrisea</i> (Meigen, 1826)
2928.		<i>Hylemyza partita</i> (Meigen, 1826)
2929.		<i>Lasiomma atricaudum</i> (Zetterstedt, 1845)
2930.		<i>Lasiomma latipenne</i> (Zetterstedt, 1838)
2931.		<i>Lasiomma seminitidum</i> (Zetterstedt, 1845)
2932.		<i>Leucophora unilineata</i> (Zetterstedt, 1838)
2933.		<i>Myopina myopina</i> (Fallén, 1824)

2934.		<i>Paradelia brunneonigra</i> (Schnabl, 1911)
2935.		<i>Paradelia helleni</i> (Ringdahl, 1932)
2936.		<i>Paradelia lunatifrons</i> (Zetterstedt, 1846)
2937.		<i>Pegomya flavoscutellata</i> (Zetterstedt, 1838)
2938.		<i>Pegomya furva</i> Ringdahl, 1938
2939.		<i>Pegomya geniculata</i> (Bouché, 1834)
2940.		<i>Pegomya incisiva</i> Stein, 1906
2941.		<i>Pegomya notabilis</i> (Zetterstedt, 1846)
2942.		<i>Pegomya scapularis</i> (Zetterstedt, 1846)
2943.		<i>Pegomya vittigera</i> (Zetterstedt, 1838)
2944.		<i>Pegomya zonata</i> (Zetterstedt, 1838)
2945.		<i>Phorbia curvicauda</i> (Zetterstedt, 1845)
2946.		<i>Strobilomyia svenssoni</i> Michelsen, 1988
2947.		<i>Subhylemyia longula</i> (Fallén, 1824)
2948.		<i>Zaphne ambigua</i> (Fallén, 1823)
2949.		<i>Zaphne caudata</i> (Zetterstedt, 1855)
2950.		<i>Zaphne divisa</i> (Meigen, 1826)
2951.		<i>Zaphne lineatocollis</i> (Zetterstedt, 1838)
2952.		<i>Zaphne nuda</i> (Schnabl, 1911)
2953.		<i>Allomyella albipennis</i> (Zetterstedt, 1838)
2954.		<i>Chaetosa punctipes</i> (Meigen, 1826)
2955.		<i>Cleigastra intermedia</i> Ozerov & Krivosheina, 2016
2956.		<i>Cordilura aberrans</i> Becker, 1894
2957.		<i>Cordilura albipes</i> Fallén, 1819
2958.		<i>Cordilura atrata</i> Zetterstedt, 1846
2959.		<i>Cordilura ciliata</i> Meigen, 1826
2960.		<i>Cordilura fuscipes</i> Zetterstedt, 1838
2961.		<i>Cordilura proboscidea</i> Zetterstedt, 1838
2962.		<i>Cordilura pubera</i> (Linnaeus, 1758)
2963.		<i>Cordilura pudica</i> Meigen, 1826
2964.		<i>Cordilura rufimana</i> Meigen, 1826
2965.		<i>Cordilura socialis</i> Becker, 1894

2966.		<i>Cordilura ustulata</i> Zetterstedt, 1838
2967.		<i>Gimnomera dorsata</i> (Zetterstedt, 1838)
2968.		<i>Gimnomera hirta</i> Hendel, 1830
2969.		<i>Gonatherus planiceps</i> (Fallén, 1826)
2970.		<i>Hexamitocera loxocerata</i> (Fallén, 1826)
2971.		<i>Leptopa filiformis</i> Zetterstedt, 1838
2972.		<i>Megaphthalma pallida</i> (Fallén, 1819)
2973.		<i>Megaphthalmoides unilineatus</i> (Zetterstedt, 1838)
2974.		<i>Microprosopa lineata</i> (Zetterstedt, 1838)
2975.		<i>Microprosopa pallidicauda</i> (Zetterstedt, 1838)
2976.		<i>Micropselapha filiformis</i> (Zetterstedt, 1846)
2977.		<i>Nanna articulata</i> (Becker, 1894)
2978.		<i>Nanna brevifrons</i> (Zetterstedt, 1838)
2979.		<i>Nanna flavipes</i> (Fallén, 1819)
2980.		<i>Nanna inermis</i> (Becker, 1894)
2981.		<i>Nanna leucostoma</i> (Zetterstedt, 1846)
2982.		<i>Nanna tibiella</i> (Zetterstedt, 1838)
2983.		<i>Okeniella caudata</i> (Zetterstedt, 1838)
2984.		<i>Orthacheta pilosa</i> (Zetterstedt, 1838)
2985.		<i>Parallelomma sellatum</i> (Hackman, 1956)
2986.		<i>Parallelomma vittatum</i> (Meigen, 1826)
2987.		<i>Phrosia albilabris</i> (Fabricius, 1805)
2988.		<i>Pogonota barbata</i> (Zetterstedt, 1838)
2989.		<i>Scathophaga furcata</i> (Say, 1823)
2990.		<i>Scathophaga inquinata</i> (Meigen, 1826)
2991.		<i>Scathophaga obscurinervis</i> Becker, 1900
2992.		<i>Scathophaga pictipennis</i> Oldenberg, 1923
2993.		<i>Scathophaga stercoraria</i> (Linnaeus, 1758)
2994.		<i>Scathophaga suilla</i> (Fabricius, 1794)
2995.		<i>Staegeria kunzei</i> (Zetterstedt, 1821)
2996.		<i>Trichopalpus fraternus</i> (Meigen, 1826)
2997.		<i>Bellardia pubicornis</i> (Zetterstedt, 1838)
2998.		<i>Bellardia vulgaris</i> (Robineau-Desvoidy, 1830)
2999.		<i>Calliphora loewi</i> Enderlein, 1903
3000.		<i>Calliphora subalpina</i> Ringdahl, 1931
3001.		<i>Calliphora vicina</i> Robineau-Desvoidy, 1830

3002.		<i>Calliphora vomitoria</i> (Linnaeus, 1758)
3003.		<i>Cynomya mortuorum</i> (Linnaeus, 1761)
3004.		<i>Melanomya nana</i> (Meigen, 1826)
3005.		<i>Brachicoma devia</i> (Fallén, 1820)
3006.		<i>Sarcophaga caerulescens</i> Zetterstedt, 1838
3007.		<i>Sarcophaga sexpunctata</i> (Fabricius, 1805)
3008.		<i>Sarcophaga vagans</i> (Meigen, 1826)
3009.		<i>Athrycia trepida</i> (Meigen, 1824)
3010.		<i>Billaea triangulifera</i> (Zetterstedt, 1844)
3011.		<i>Lypha dubia</i> (Fallén, 1810)
3012.		<i>Macquartia dispar</i> (Fallén, 1820)
3013.		<i>Macquartia tenebricosa</i> (Meigen, 1824)
3014.		<i>Nowickia alpina</i> (Zetterstedt, 1849)
3015.		<i>Platymya fimbriata</i> (Meigen, 1824)
3016.		<i>Ramonda ringdahli</i> (Villeneuve, 1922)
3017.		<i>Siphona confusa</i> Mesnil, 1961
3018.		<i>Siphona cristata</i> (Fabricius, 1805)
3019.		<i>Siphona geniculata</i> (De Geer, 1776)
3020.		<i>Trafoia monticola</i> Brauer & Bergenstamm, 1893
3021.		<i>Trigonospila ludio</i> (Zetterstedt, 1849)
3022.		<i>Trixa coerulescens</i> Meigen, 1824